

Tableaux

4.1. Etat nutritionnel des adultes (18 ans et plus)

- 4.1.1. Etat nutritionnel des adultes de 18 ans et plus (indice de masse corporelle)
- 4.1.2. Diversité de la nourriture et diversité du régime alimentaire chez la population adulte

4.2. Maladies de nature durable, handicaps, limitations d'activité

- 4.2.1. Maladies de nature durable ou handicaps
- 4.2.2. Limitations d'activité

4.3. Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête et utilisation des services de santé

- 4.3.1. Maladies ou blessures
- 4.3.2. Utilisation des services de santé
- 4.3.3. Appréciation des soins de santé

4.4. Maladies des enfants de moins de 5 ans survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête

4.5. Autoévaluation de l'état de santé

4.6. Habitudes tabagiques, consommation d'alcool et de drogue

- 4.6.1. Habitudes tabagiques
- 4.6.2. Consommation d'alcool
- 4.6.3. Consommation de drogue

4.7. Santé mentale des personnes de 15 ans et plus (détresse psychologique)

4.8. Connaissance du Sida et prévalence du Sida

4.9. Santé de la reproduction

- 4.9.1. Soins pré-natals
- 4.9.2. Soins post-natals

4.10. Couverture assurantielle

4. SANTE

4.1. Santé et état nutritionnel des adultes (18 ans et plus)

4.1.1. Etat nutritionnel des adultes de 18 ans et plus (indice de masse corporelle)

Tableau 4.1.1.1.

Distribution en pourcentage (%) de la population adulte (18 ans et plus) selon l'Indice de Masse corporelle (IMC) par milieu de résidence.

| Indice de Masse Corporelle (IMC) | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Insuffisance pondérale bénigne (IMC <16) | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 1.9 |
| Insuffisance pondérale modérée (IMC 16-16.9) | 1.3 | 3.3 | 3.6 | 3.0 |
| Insuffisance pondérale grave (IMC 17-18.4) | 4.3 | 8.4 | 10.4 | 8.6 |
| Normal (IMC 18.5-24.9) | 64.5 | 62.7 | 68.0 | 66.1 |
| Surcharge pondérale légère (IMC 25-29.9) | 23.1 | 18.0 | 13.0 | 16.4 |
| Obèse (IMC >=30) | 6.2 | 5.3 | 2.6 | 4.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1752 | 2509 | 7212 | 11473 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.1.2.

Moyenne et écart-type de l'Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus) par milieu de résidence.

| Indice de Masse Corporelle (IMC) | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Moyenne | 23.5 | 22.5 | 21.8 | 22.3 |
| Écart-type | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.9 |
| Echantillon | 1752 | 2509 | 7212 | 11473 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.1.3.

Distribution de la population adulte (18 ans et plus) en pourcentage (%) selon l'indice de Masse corporelle (IMC) par département géographique.

| Indice de Masse Corporelle (IMC) | Département géographique | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Insuffisance pondérale bénigne (IMC <16) | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 4.2 | 1.3 |
| Insuffisance pondérale modérée (IMC 16-16.9) | 1.6 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 2.9 |
| Insuffisance pondérale grave (IMC 17-18.4) | 5.2 | 12.7 | 8.9 | 11.9 | 7.6 |
| Normal (IMC 18.5-24.9) | 64.8 | 69.8 | 65.1 | 65.4 | 68.2 |
| Surcharge pondérale légère (IMC 25-29.9) | 22.0 | 9.7 | 17.8 | 11.0 | 16.5 |
| Obèse (IMC >=30) | 5.3 | 2.7 | 4.0 | 3.3 | 3.5 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3306 | 824 | 1322 | 656 | 1426 |

Tableau 4.1.1.3. (suite)

| Indice de Masse Corporelle (IMC) | Département géographique | | | | | Ensemble |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | Nord-Est | |
| Insuffisance pondérale bénigne (IMC <16) | 2.8 | 2.9 | 4.8 | 2.6 | 1.9 | 1.9 |
| Insuffisance pondérale modérée (IMC 16-16.9) | 4.4 | 4.4 | 6.8 | 3.8 | 3.0 | 3.0 |
| Insuffisance pondérale grave (IMC 17-18.4) | 14.1 | 10.8 | 11.8 | 15.4 | 8.6 | 8.6 |
| Normal (IMC 18.5-24.9) | 64.8 | 69.1 | 63.7 | 70.8 | 66.1 | 66.1 |
| Surcharge pondérale légère (IMC 25-29.9) | 11.0 | 10.4 | 9.5 | 6.5 | 16.4 | 16.4 |
| Obèse (IMC >=30) | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 0.9 | 4.0 | 4.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 882 | 1053 | 1044 | 960 | 11473 | 11473 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.1.4.

Moyenne et écart-type de l'Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus) par département géographique.

| Indice de Masse Corporelle (IMC) | Département géographique | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------|------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Moyenne | 23.2 | 21.3 | 22.5 | 21.6 | 22.5 |
| Ecart-type | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 3.8 |
| Echantillon | 3306 | 824 | 1322 | 656 | 1426 |

Tableau 4.1.1.4. (suite)

| Indice de Masse Corporelle (IMC) | Département géographique | | | | Ensemble |
|----------------------------------|--------------------------|------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Moyenne | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 20.8 | 22.3 |
| Ecart-type | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 3.9 |
| Echantillon | 882 | 1053 | 1044 | 960 | 11473 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.1.5.

Distribution de la population adulte (18 ans et plus) en pourcentage (%) selon l'indice de masse corporelle (IMC) par sexe.

| Indice de Masse Corporelle (IMC) | Sexe | | Ensemble |
|----------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Insuffisance pondérale bénigne (IMC <16) | 1.3 | 2.2 | 1.9 |
| Insuffisance pondérale modérée (IMC 16-16.9) | 2.5 | 3.1 | 3.0 |
| Insuffisance pondérale grave (IMC 17-18.4) | 8.4 | 8.6 | 8.6 |
| Normal (IMC 18.5-24.9) | 75.7 | 63.1 | 66.1 |
| Surcharge pondérale légère (IMC 25-29.9) | 11.1 | 18.1 | 16.4 |
| Obèse (IMC >=30) | 1.0 | 4.9 | 4.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2753 | 8720 | 11473 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.1.6.

Moyenne et écart-type de l'Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus) par sexe.

| Indice de Masse Corporelle (IMC) | Sexe | | Ensemble |
|----------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Moyenne | 21.8 | 22.5 | 22.3 |
| Ecart-type | 3.1 | 4.1 | 3.9 |
| Echantillon | 2753 | 8720 | 11473 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.1.7.

Distribution de la population adulte (18 ans et plus) en pourcentage (%) selon l'indice de masse corporelle (IMC) par tranche d'âge.

| Indice de Masse Corporelle (IMC) | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|----------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | 18-29 ans | 30-39ans | 40-49 ans | 50-59 ans | |
| Insuffisance pondérale bénine (IMC <16) | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 6.6 |
| Insuffisance pondérale modérée (IMC 16-16.9) | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 4.6 | 6.5 |
| Insuffisance pondérale grave (IMC 17-18.4) | 8.0 | 5.5 | 7.1 | 9.7 | 14.1 |
| Normal (IMC 18.5-24.9) | 73.0 | 66.9 | 63.4 | 62.5 | 56.0 |
| Surcharge pondérale légère (IMC 25-29.9) | 14.3 | 19.4 | 20.5 | 15.8 | 13.7 |
| Obèse (IMC >=30) | 2.3 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 3.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3894 | 2327 | 1902 | 1366 | 11473 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.1.8.

Moyenne et écart-type de l'indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus) par tranche d'âge.

| Indice de Masse Corporelle (IMC) | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|----------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|----------|
| | 18- 29 ans | 30- 39ans | 40- 49 ans | 50- 59 ans | |
| Moyenne | 22.1 | 23.1 | 23.1 | 22.3 | 21.2 |
| Ecart-type | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| Echantillon | 3894 | 2327 | 1902 | 1366 | 11473 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.1.9.

Distribution de la population adulte (18 ans et plus) en pourcentage (%) selon l'Indice de Masse corporelle (IMC) par quintile du revenu du ménage.

| Indice de Masse Corporelle (IMC) | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Insuffisance pondérale bénine (IMC <16) | 3.4 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 1.9 |
| Insuffisance pondérale modérée (IMC 16-16.9) | 4.6 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 3.0 |
| Insuffisance pondérale grave (IMC 17-18.4) | 11.8 | 10.7 | 9.0 | 8.8 | 3.9 | 8.6 |
| Normal (IMC 18.5-24.9) | 66.1 | 68.4 | 68.7 | 68.2 | 60.6 | 66.1 |
| Surcharge pondérale légère (IMC 25-29.9) | 12.1 | 11.6 | 14.3 | 15.8 | 25.5 | 16.4 |
| Obèse (IMC >=30) | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 7.2 | 4.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2233 | 2321 | 2321 | 2340 | 2258 | 11473 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.1.10.

Moyenne et écart-type de l'Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus) par quintile du revenu total du ménage.

| Indice de Masse Corporelle (IMC) | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Moyenne | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 23.6 | 22.3 |
| Ecart-type | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 3.9 |
| Echantillon | 2233 | 2321 | 2321 | 2340 | 2258 | 11473 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

4.1.2. Diversité de la nourriture chez la population adulte (18 ans et plus)

Tableau 4.1.2.1.

Distribution de la population adulte (18 ans et +) en pourcentage (%) selon la diversité de la nourriture par milieu de résidence.

| Score de diversité de la nourriture | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Faible: 1-9 | 11.3 | 32.1 | 35.9 | 28.9 |
| Moyen: 10-14 | 25.0 | 27.1 | 33.0 | 30.0 |
| Elevé: >=15 | 63.7 | 40.8 | 31.1 | 41.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1922 | 2616 | 7612 | 12150 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.2.2.

Moyenne et écart-type du score de diversité de la nourriture chez la population adulte (18 ans et +) par milieu de résidence.

| Score de diversité de la nourriture | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Moyenne | 18.5 | 14.0 | 12.3 | 14.2 |
| Ecart-type | 9.4 | 7.8 | 6.3 | 7.9 |
| Echantillon | 1922 | 2616 | 7612 | 12150 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.2.3.

Distribution de la population adulte (18 ans et plus) en pourcentage (%) selon le score de diversité de la nourriture par département géographique.

| Score de diversité de la nourriture | Département géographique | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Faible: 1-9 | 20.0 | 19.9 | 14.4 | 63.1 | 48.2 |
| Moyen: 10-14 | 27.6 | 34.3 | 26.9 | 24.3 | 32.5 |
| Elevé: >=15 | 52.4 | 45.8 | 58.7 | 12.6 | 19.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3536 | 890 | 1343 | 672 | 1479 |

Tableau 4.1.2.3. (suite)

| Score de diversité de la nourriture | Département géographique | | | | Ensemble |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Faible: 1-9 | 31.9 | 21.5 | 46.4 | 44.3 | 28.9 |
| Moyen: 10-14 | 29.9 | 39.6 | 31.0 | 30.4 | 30.0 |
| Elevé: >=15 | 38.2 | 38.9 | 22.6 | 25.3 | 41.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 952 | 1133 | 1165 | 980 | 12150 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.2.4.

Moyenne et écart-type du score de diversité de la nourriture chez la population adulte (18 ans et +) par département géographique.

| Score de diversité de la nourriture | Département géographique | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Moyenne | 16.4 | 14.7 | 16.6 | 9.3 | 10.5 |
| Ecart-type | 8.9 | 6.6 | 7.2 | 5.2 | 5.4 |
| Echantillon | 3536 | 890 | 1343 | 672 | 1479 |

Tableau 4.1.2.4. (suite)

| Score de diversité de la nourriture | Département géographique | | | | Ensemble |
|-------------------------------------|--------------------------|------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Moyenne | 13.7 | 13.9 | 10.8 | 11.2 | 14.2 |
| Ecart-type | 7.9 | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 7.9 |
| Echantillon | 952 | 1133 | 1165 | 980 | 12150 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.2.5.

Distribution de la population adulte (18 ans et +) en pourcentage (%) selon le score de diversité de la nourriture par quintile du revenu du ménage.

| Score de diversité de la nourriture | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Faible: 1-9 | 54.5 | 36.3 | 29.7 | 21.2 | 11.4 | 28.9 |
| Moyen: 10-14 | 28.9 | 31.9 | 34.7 | 33.9 | 22.1 | 30.0 |
| Elevé: >=15 | 16.6 | 31.8 | 35.6 | 44.9 | 66.5 | 41.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2332 | 2444 | 2462 | 2479 | 2433 | 12150 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.2.6.

Moyenne et écart-type du score de diversité de la nourriture chez la population adulte (18 ans et +) en pourcentage (%) par quintile du revenu total du ménage.

| Score de diversité de la nourriture | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Moyenne | 10.2 | 12.2 | 13.2 | 14.9 | 18.7 | 14.2 |
| Ecart-type | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 7.4 | 8.5 | 7.9 |
| Echantillon | 2332 | 2444 | 2462 | 2479 | 2433 | 12150 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.2.7.

Distribution de la population adulte (18 ans et +) en pourcentage (%) selon le score de diversité du régime alimentaire par milieu de résidence.

| Score de diversité du régime alimentaire | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Faible: 1- 3 | 14.0 | 21.0 | 26.0 | 22.0 |
| Moyen: 4- 5 | 38.0 | 51.0 | 55.0 | 50.0 |
| Elevé: >5 | 48.0 | 28.0 | 19.0 | 28.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1922 | 2616 | 7596 | 12134 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.2.8.

Moyenne et écart-type du score de diversité du régime alimentaire chez la population adulte (18 ans et +) par milieu de résidence.

| Score de diversité du régime alimentaire | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Moyenne | 5.4 | 4.7 | 4.4 | 4.7 |
| Ecart-type | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| Echantillon | 1922 | 2616 | 7596 | 12134 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.2.9.

Distribution du score de diversité du régime alimentaire chez la population adulte (18 ans et +) en pourcentage (%) par département géographique.

| Score de diversité du régime alimentaire | Département géographique | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Faible: 1- 3 | 18.1 | 14.6 | 9.2 | 49.4 | 32.8 |
| Moyen: 4- 5 | 43.2 | 61.4 | 58.4 | 42.7 | 50.8 |
| Elevé: >5 | 38.7 | 24.0 | 32.4 | 7.9 | 16.4 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3532 | 890 | 1336 | 672 | 1479 |

Tableau 4.1.2.9. (suite)

| Score de diversité du régime alimentaire | Département géographique | | | | Ensemble |
|------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Faible: 1- 3 | 26.6 | 13.5 | 29.2 | 38.3 | 22.2 |
| Moyen: 4- 5 | 56.1 | 59.7 | 52.9 | 47.9 | 49.8 |
| Elevé: >5 | 17.3 | 26.8 | 17.9 | 13.8 | 28.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 952 | 1133 | 1165 | 975 | 12134 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.2.10.

Moyenne et écart-type du score moyen de diversité du régime alimentaire chez la population adulte (18 ans et +) par département géographique.

| Score de diversité du régime alimentaire | Département géographique | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------|---------|------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Moyenne | 5.1 | 4.7 | 5.0 | 3.7 | 4.2 |
| Ecart-type | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| Echantillon | 3532 | 890 | 1336 | 672 | 1479 |

Tableau 4.1.2.10. (suite)

| Score de diversité du régime alimentaire | Département géographique | | | | Ensemble |
|------------------------------------------|--------------------------|------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Moyenne | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 4.7 |
| Ecart-type | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| Echantillon | 952 | 1133 | 1165 | 975 | 12134 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.2.11.

Distribution de la population adulte (18 ans et +) en pourcentage (%) selon le score de diversité du régime alimentaire par quintile du revenu du ménage.

| Score de diversité du régime alimentaire | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Faible: 1- 3 | 40.7 | 27.2 | 22.7 | 17.6 | 9.0 | 22.2 |
| Moyen: 4- 5 | 49.3 | 56.0 | 55.8 | 51.7 | 39.1 | 49.8 |
| Elevé: >5 | 10.0 | 16.8 | 21.5 | 30.7 | 51.9 | 28.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2327 | 2444 | 2456 | 2474 | 2433 | 12134 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.2.12.

Moyenne et écart-type du score de diversité du régime alimentaire chez la population adulte (18 ans et +) par quintile du revenu total du ménage.

| Score de diversité du régime alimentaire | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Moyenne | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 4.7 |
| Ecart-type | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Echantillon | 2327 | 2444 | 2456 | 2474 | 2433 | 12134 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

4.2. Maladies de nature durable, handicaps, limitations d'activité

4.2.1. Maladies de nature durable ou handicaps

Tableau 4.2.1.1.

Distribution en pourcentage (%) de la population selon l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap par milieu de résidence.

| Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Maladie de nature durable | 10.7 | 11.1 | 9.9 | 10.3 |
| Maladie et blessure | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Ni l'une ni l'autre | 89.1 | 88.6 | 89.9 | 89.5 |
| NSP | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 4468 | 5408 | 23001 | 32877 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) 130 enquêtés n'ont pas répondu à la question sur l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap

Tableau 4.2.1.2.

Distribution en pourcentage (%) de la population selon l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap par département géographique.

| Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap | Département géographique | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Maladie de nature durable | 10.3 | 17.1 | 15.6 | 5.9 | 8.2 |
| Maladie et blessure | - | - | - | - | 0.3 |
| Ni l'une ni l'autre | 89.6 | 82.8 | 84.1 | 94.1 | 91.5 |
| NSP | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 8399 | 2558 | 3750 | 1938 | 3917 |

Tableau 4.2.1.2. (suite)

| Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap | Département géographique | | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Maladie de nature durable | 9.4 | 9.7 | 4.3 | 11.7 | 10.3 |
| Maladie et blessure | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Ni l'une ni l'autre | 90.5 | 90.3 | 95.6 | 88.3 | 89.5 |
| NSP | 0.0 | - | - | - | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2788 | 3194 | 3330 | 3003 | 32877 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

130 enquêtés n'ont pas répondu à la question sur l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap.

Tableau 4.2.1.3.

Distribution en pourcentage (%) de la population selon l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap par sexe.

| Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap | Sexe | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Maladie de nature durable | 8.5 | 11.9 | 10.3 |
| Maladie et blessure | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ni l'une ni l'autre | 91.3 | 87.9 | 89.5 |
| NSP | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 15890 | 16987 | 32877 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 130 enquêtés n'ont pas répondu à la question sur l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap

Tableau 4.2.1.4.

Distribution en pourcentage (%) de la population selon l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap par tranche d'âge.

| Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap | Tranche d'âge | | | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------------|----------|
| | 0- 14 | 15- 29 | 30- 44 | 45- 59 | 60 ans et plus | |
| Maladie de nature durable | 3.6 | 6.4 | 12.5 | 19.8 | 36.8 | 10.3 |
| Maladie et blessure | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 |
| Ni l'une ni l'autre | 96.3 | 93.4 | 87.3 | 80.1 | 62.9 | 89.5 |
| NSP | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 12865 | 8584 | 5016 | 3415 | 2997 | 32877 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 130 enquêtés n'ont pas répondu à la question sur l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap.

Tableau 4.2.1.5.

Distribution en pourcentage (%) de la population selon l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap par situation d'activité.

| Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap | Situation d'activité | | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|
| | Actifs occupés | Chômeurs | Inactifs | Hors population en âge de travailler | |
| Maladie de nature durable | 13.1 | 12.6 | 12.1 | 3.5 | 10.3 |
| Maladie et blessure | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ni l'une ni l'autre | 86.8 | 87.1 | 87.8 | 96.4 | 89.5 |
| NSP | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 9171 | 2894 | 12380 | 8432 | 32877 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

130 enquêtés n'ont pas répondu à la question sur l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap

Tableau 4.2.1.6.

Distribution en pourcentage (%) de la population selon l'existence d'une maladie de nature durable d'une blessure ou d'un handicap par quintile du revenu total du ménage.

| Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Maladie de nature durable | 11.1 | 10.9 | 9.3 | 11.4 | 8.9 | 10.3 |
| Maladie et blessure | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | 0.1 |
| Ni l'une ni l'autre | 88.5 | 89.1 | 90.5 | 88.6 | 91.0 | 89.5 |
| NSP | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 6375 | 6724 | 6712 | 6835 | 6231 | 32877 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

130 enquêtés n'ont pas répondu à la question sur l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap

Tableau 4.2.1.7.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon l'âge d'occurrence de la maladie, de la blessure ou du handicap par milieu de résidence.

| Tranche d'âge d'occurrence | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Depuis la naissance | 11.8 | 9.1 | 8.2 | 9.2 |
| 1 -14 ans | 17.8 | 14.9 | 15.0 | 15.6 |
| 15- 29 | 24.7 | 21.9 | 16.1 | 18.9 |
| 30- 44 | 21.1 | 15.9 | 17.5 | 18.1 |
| 45- 59 | 8.0 | 16.6 | 18.8 | 16.0 |
| 60 ans et plus | 7.9 | 14.4 | 16.0 | 13.9 |
| NSP | 8.7 | 7.2 | 8.4 | 8.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 436 | 584 | 2204 | 3224 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

L'information quant à l'âge d'occurrence pour 196 individus n'est pas disponible.

Tableau 4.2.1.8.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon l'âge d'occurrence de la maladie, de la blessure ou du handicap par département géographique.

| Tranche d'âge d'occurrence | Département géographique | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Depuis la naissance | 10.3 | 16.0 | 11.8 | 6.6 | 3.8 |
| 1 -14 ans | 16.9 | 14.9 | 19.9 | 9.4 | 14.8 |
| 15- 29 | 19.2 | 20.6 | 18.3 | 12.5 | 22.8 |
| 30- 44 | 21.8 | 14.3 | 11.5 | 14.1 | 15.7 |
| 45- 59 | 14.2 | 14.0 | 11.4 | 18.2 | 19.0 |
| 60 ans et plus | 10.7 | 14.3 | 9.6 | 32.8 | 10.9 |
| NSP | 6.9 | 5.9 | 17.5 | 6.4 | 13.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 777 | 418 | 571 | 105 | 316 |

Tableau 4.2.1.8.(suite)

| Tranche d'âge d'occurrence | Département géographique | | | | Ensemble |
|----------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Depuis la naissance | 5.6 | 6.9 | 6.7 | 3.9 | 9.2 |
| 1 -14 ans | 19.4 | 11.0 | 6.7 | 10.0 | 15.6 |
| 15- 29 | 18.6 | 13.5 | 19.4 | 19.3 | 18.9 |
| 30- 44 | 21.7 | 21.7 | 16.7 | 17.0 | 18.1 |
| 45- 59 | 15.0 | 20.7 | 27.0 | 23.1 | 16.0 |
| 60 ans et plus | 15.3 | 25.5 | 17.8 | 22.5 | 13.9 |
| NSP | 4.4 | 0.7 | 5.7 | 4.2 | 8.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 256 | 314 | 140 | 327 | 3224 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) L'information quant à l'âge d'occurrence pour 196 individus n'est pas disponible.

Tableau 4.2.1.9.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon l'âge d'occurrence de la maladie, de la blessure ou du handicap par sexe.

| Tranche d'âge d'occurrence | Sexe | | Ensemble |
|----------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Depuis la naissance | 11.1 | 7.9 | 9.2 |
| 1 -14 ans | 16.6 | 15.0 | 15.6 |
| 15- 29 | 17.4 | 19.9 | 18.9 |
| 30- 44 | 17.0 | 18.8 | 18.1 |
| 45- 59 | 14.2 | 17.2 | 16.0 |
| 60 ans et plus | 15.6 | 12.8 | 13.9 |
| NSP | 8.1 | 8.4 | 8.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1321 | 1903 | 3224 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
L'information quant à l'âge d'occurrence pour 196 individus n'est pas disponible.

Tableau 4.2.1.10.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon l'âge d'occurrence de la maladie, de la blessure ou du handicap par tranche d'âge.

| Tranche d'âge d'occurrence | Tranche d'âge | | | | | Ensemble |
|----------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------------|----------|
| | 0- 14 | 15- 29 | 30- 44 | 45- 59 | 60 ans et plus | |
| Depuis la naissance | 40.3 | 13.8 | 6.2 | 2.6 | 1.7 | 9.2 |
| 1 -14 ans | 58.8 | 30.7 | 9.7 | 5.3 | 2.7 | 15.6 |
| 15- 29 | - | 49.8 | 37.5 | 11.7 | 3.9 | 18.9 |
| 30- 44 | - | - | 38.1 | 35.1 | 11.2 | 18.1 |
| 45- 59 | - | - | - | 33.8 | 28.2 | 16.0 |
| 60 ans et plus | - | - | - | - | 42.3 | 13.9 |
| NSP | 0.9 | 5.7 | 8.5 | 11.5 | 10.0 | 8.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 341 | 509 | 605 | 663 | 1106 | 3224 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH).

L'information quant à l'âge d'occurrence pour 196 individus n'est pas disponible.

Tableau 4.2.1.11.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon la tranche d'âge d'occurrence de la maladie, de la blessure ou du handicap par situation d'activité.

| Tranche d'âge d'occurrence | Situation d'activité | | | | Ensemble |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|
| | Actifs occupés | Chômeurs | Inactifs | Hors population en âge de travailler | |
| Depuis la naissance | 4.8 | 7.0 | 7.1 | 46.3 | 9.2 |
| 1 -14 ans | 6.9 | 20.2 | 15.0 | 53.2 | 15.6 |
| 15- 29 | 24.2 | 30.8 | 14.3 | - | 18.9 |
| 30- 44 | 26.3 | 21.9 | 13.3 | - | 18.1 |
| 45- 59 | 17.1 | 13.4 | 18.6 | - | 16.0 |
| 60 ans et plus | 8.7 | 2.4 | 24.0 | - | 13.9 |
| NSP | 12.0 | 4.3 | 7.7 | 0.5 | 8.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1200 | 369 | 1434 | 221 | 3224 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH).

L'information quant à l'âge d'occurrence pour 196 individus n'est pas disponible.

Tableau 4.2.1.12.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon l'âge d'occurrence de la maladie, de la blessure ou du handicap par quintile du revenu total du ménage.

| Tranche d'âge d'occurrence | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Depuis la naissance | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.0 | 12.3 | 9.2 |
| 1 -14 ans | 13.0 | 16.2 | 13.1 | 20.4 | 14.2 | 15.6 |
| 15- 29 | 18.9 | 18.4 | 18.6 | 18.2 | 20.9 | 18.9 |
| 30- 44 | 13.0 | 15.7 | 18.1 | 21.2 | 21.8 | 18.1 |
| 45- 59 | 19.2 | 15.7 | 17.3 | 14.5 | 13.7 | 16.0 |
| 60 ans et plus | 19.3 | 16.9 | 14.2 | 9.6 | 10.4 | 13.9 |
| NSP | 9.1 | 8.9 | 9.8 | 7.1 | 6.7 | 8.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 702 | 705 | 596 | 667 | 554 | 3224 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH).

L'information quant à l'âge d'occurrence pour 196 individus n'est pas disponible.

Tableau 4.2.1.13.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon la difficulté à se déplacer sans aide par milieu de résidence.

| Difficulté à se déplacer sans aide | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Oui, c'est un peu difficile | 22.8 | 31.9 | 38.0 | 33.7 |
| Oui, c'est très difficile | 15.0 | 22.2 | 21.5 | 20.1 |
| Non | 62.0 | 45.9 | 40.1 | 45.9 |
| NSP | 0.2 | - | 0.4 | 0.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 426 | 578 | 2189 | 3193 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

127 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant leur difficulté à se déplacer

Tableau 4.2.1.14.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon la difficulté à se déplacer sans aide par département géographique.

| Difficulté à se déplacer sans aide | Département géographique | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Oui, c'est un peu difficile | 25.8 | 19.2 | 24.8 | 52.0 | 46.6 |
| Oui, c'est très difficile | 14.9 | 27.0 | 18.1 | 27.5 | 28.3 |
| Non | 59.2 | 53.8 | 56.5 | 20.5 | 24.1 |
| NSP | 0.2 | - | 0.6 | - | 1.0 |
| Total | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 765 | 411 | 574 | 103 | 310 |

Tableau 4.2.1.14. (suite)

| Difficulté à se déplacer sans aide | Département géographique | | | | Ensemble |
|------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Oui, c'est un peu difficile | 39.9 | 53.4 | 32.2 | 63.2 | 33.7 |
| Oui, c'est très difficile | 16.4 | 22.4 | 22.3 | 26.4 | 20.1 |
| Non | 43.7 | 24.2 | 45.5 | 10.1 | 45.9 |
| NSP | - | - | - | 0.3 | 0.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 254 | 309 | 143 | 324 | 3193 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

127 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant leur difficulté à se déplacer

Tableau 4.2.1.16.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon la difficulté à se déplacer sans aide par tranche d'âge.

| Difficulté à se déplacer sans aide | Tranche d'âge | | | | | Ensemble |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------------|----------|
| | 0- 14 | 15- 29 | 30- 44 | 45- 59 | 60 ans et plus | |
| Oui, c'est un peu difficile | 27.2 | 30.1 | 32.0 | 33.1 | 38.9 | 33.7 |
| Oui, c'est très difficile | 15.3 | 12.8 | 15.2 | 16.3 | 30.6 | 20.1 |
| Non | 56.7 | 56.9 | 52.3 | 50.3 | 30.5 | 45.9 |
| NSP | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | - | 0.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 317 | 514 | 599 | 664 | 1099 | 3193 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

127 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant leur difficulté à se déplacer

Tableau 4.2.1.17.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon la difficulté à se déplacer sans aide par situation d'activité.

| Difficulté à se déplacer sans aide | Situation d'activité | | | | Ensemble |
|------------------------------------|----------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|
| | Actifs occupés | Chômeurs | Inactifs | Hors population en âge de travailler | |
| Oui, c'est un peu difficile | 33.8 | 32.7 | 34.8 | 27.5 | 33.7 |
| Oui, c'est très difficile | 14.6 | 9.3 | 28.9 | 13.5 | 20.1 |
| Non | 51.5 | 57.1 | 36.3 | 57.6 | 45.9 |
| NSP | 0.2 | 0.9 | - | 1.4 | 0.3 |
| Total | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1201 | 371 | 1425 | 196 | 3193 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

127 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant leur difficulté à se déplacer

Tableau 4.2.1.18.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon la difficulté à se déplacer sans aide par quintile du revenu total du ménage.

| Difficulté à se déplacer sans aide | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Oui, c'est un peu difficile | 36.7 | 40.6 | 37.6 | 26.8 | 28.0 | 33.7 |
| Oui, c'est très difficile | 25.3 | 21.4 | 19.3 | 16.0 | 19.3 | 20.1 |
| Non | 36.6 | 38.0 | 43.1 | 57.1 | 52.7 | 45.9 |
| NSP | 1.4 | - | - | 0.1 | - | 0.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 695 | 696 | 591 | 659 | 552 | 3193 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

127 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant leur difficulté à se déplacer

4.2.2. Limitations d'activité

Tableau 4.2.2.1.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à monter et descendre les escaliers par milieu de résidence.

| Capacité à monter et à descendre les escaliers | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Oui, sans problème | 85.9 | 78.6 | 74.2 | 77.6 |
| Oui, avec difficulté | 12.4 | 15.7 | 18.3 | 16.5 |
| Non | 1.7 | 5.7 | 7.2 | 5.7 |
| NSP | - | - | 0.3 | 0.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 989 | 1143 | 4963 | 7095 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

16 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à monter et à descendre des escaliers

Tableau 4.2.2.2.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à monter et descendre les escaliers par sexe.

| Capacité à monter et à descendre les escaliers | Sexe | | Ensemble |
|------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Oui, sans problème | 85.6 | 70.1 | 77.6 |
| Oui, avec difficulté | 10.4 | 22.2 | 16.5 |
| Non | 3.9 | 7.4 | 5.7 |
| NSP | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3041 | 4054 | 7095 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 16 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à monter et à descendre des escaliers

Tableau 4.2.2.3.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à monter et descendre les escaliers par tranche d'âge.

| Capacité à monter et à descendre les escaliers | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Oui, sans problème | 92.3 | 84.3 | 63.4 | 28.4 | 77.6 |
| Oui, avec difficulté | 6.5 | 13.0 | 30.4 | 43.5 | 16.5 |
| Non | 1.1 | 2.6 | 5.9 | 27.5 | 5.7 |
| NSP | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2669 | 1988 | 1181 | 1257 | 7095 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

16 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à monter et à descendre des escaliers

Tableau 4.2.2.4.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à monter et descendre les escaliers par situation d'activité.

| Capacité à monter et à descendre les escaliers | Situation d'activité | | | Ensemble |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------|----------|
| | Actif occupé | Chômeur au sens du BIT | Inactif | |
| Oui, sans problème | 77.9 | 85.6 | 74.0 | 77.6 |
| Oui, avec difficulté | 18.4 | 11.7 | 16.5 | 16.5 |
| Non | 3.5 | 2.6 | 9.3 | 5.7 |
| NSP | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3376 | 859 | 2860 | 7095 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
16 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à monter et à descendre des escaliers

Tableau 4.2.2.5.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à monter et descendre les escaliers par quintile du revenu total du ménage.

| Capacité à monter et à descendre les escaliers | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Oui, sans problème | 64.2 | 74.1 | 78.7 | 82.1 | 84.6 | 77.6 |
| Oui, avec difficulté | 25.1 | 18.5 | 15.0 | 14.0 | 12.6 | 16.5 |
| Non | 10.3 | 7.0 | 6.1 | 3.9 | 2.8 | 5.7 |
| NSP | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1562 | 1551 | 1465 | 1358 | 1159 | 7095 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
16 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à monter et à descendre des escaliers

Tableau 4.2.2.6.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes par milieu de résidence.

| Capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Oui, sans problème | 84.2 | 80.2 | 75.3 | 78.1 |
| Oui, avec difficulté | 12.4 | 13.2 | 16.3 | 14.9 |
| Non | 3.2 | 6.6 | 8.4 | 6.9 |
| NSP | 0.2 | - | - | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 988 | 1143 | 4962 | 7093 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
18 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes

Tableau 4.2.2.7.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes par sexe.

| Capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes | Sexe | | Ensemble |
|----------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Oui, sans problème | 85.4 | 71.4 | 78.1 |
| Oui, avec difficulté | 10.1 | 19.4 | 14.9 |
| Non | 4.4 | 9.2 | 6.9 |
| NSP | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3041 | 4052 | 7093 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
18 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes

Tableau 4.2.2.8.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes par tranche d'âge.

| Capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Oui, sans problème | 92.7 | 83.9 | 65.9 | 29.1 | 78.1 |
| Oui, avec difficulté | 5.6 | 13.3 | 25.1 | 39.8 | 14.9 |
| Non | 1.7 | 2.8 | 9.0 | 30.7 | 6.9 |
| NSP | 0.0 | 0.0 | - | 0.4 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2669 | 1987 | 1181 | 1256 | 7093 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
18 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes

Tableau 4.2.2.9.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes par situation d'activité.

| Capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes | Situation d'activité | | | Ensemble |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------|----------|
| | Actif occupé | Chômeur au sens du BIT | Inactif | |
| Oui, sans problème | 78.7 | 86.3 | 74.2 | 78.1 |
| Oui, avec difficulté | 17.0 | 10.0 | 14.8 | 14.9 |
| Non | 4.3 | 3.6 | 10.8 | 6.9 |
| NSP | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3374 | 859 | 2860 | 7093 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
18 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes

Tableau 4.2.2.10.

Distribution en pourcentage (%) de la population selon la capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes par quintile du revenu total du ménage.

| Capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Oui, sans problème | 67.8 | 75.0 | 78.1 | 82.3 | 84.0 | 78.1 |
| Oui, avec difficulté | 19.5 | 17.0 | 14.7 | 12.4 | 12.5 | 14.9 |
| Non | 12.7 | 7.9 | 7.2 | 5.0 | 3.5 | 6.9 |
| NSP | | 0.1 | | 0.3 | | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1562 | 1551 | 1465 | 1358 | 1157 | 7093 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

18 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes

Tableau 4.2.2.11.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance par milieu de résidence.

| Capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Oui, sans problème | 80.0 | 78.2 | 73.0 | 75.4 |
| Oui, avec difficulté | 12.7 | 11.8 | 15.3 | 14.2 |
| Non | 7.0 | 10.0 | 11.6 | 10.3 |
| NSP | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 988 | 1143 | 4959 | 7090 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) 11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance

Tableau 4.2.2.12.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance par sexe.

| Capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance | Sexe | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Oui, sans problème | 81.7 | 69.5 | 75.4 |
| Oui, avec difficulté | 10.9 | 17.3 | 14.2 |
| Non | 7.2 | 13.1 | 10.3 |
| NSP | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3040 | 4050 | 7090 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance

Tableau 4.2.2.13.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance par tranche d'âge.

| Capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Oui, sans problème | 90.6 | 82.6 | 61.6 | 23.7 | 75.4 |
| Oui, avec difficulté | 6.4 | 11.9 | 26.3 | 32.8 | 14.2 |
| Non | 3.0 | 5.2 | 11.8 | 43.3 | 10.3 |
| NSP | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2667 | 1986 | 1181 | 1256 | 7090 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance

Tableau 4.2.2.14.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance par situation d'activité.

| Capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance | Situation d'activité | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|----------|
| | Actif occupé | Chômeur | Inactif | |
| Oui, sans problème | 75.3 | 83.3 | 72.4 | 75.4 |
| Oui, avec difficulté | 17.2 | 10.8 | 12.4 | 14.2 |
| Non | 7.3 | 5.6 | 15.2 | 10.3 |
| NSP | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3373 | 858 | 2859 | 7090 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance

Tableau 4.2.2.15.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance par quintile du revenu total du ménage.

| Capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Oui, sans problème | 64.3 | 72.8 | 76.4 | 79.2 | 81.1 | 75.4 |
| Oui, avec difficulté | 19.1 | 15.7 | 13.3 | 12.6 | 11.6 | 14.2 |
| Non | 16.5 | 11.4 | 10.3 | 8.0 | 7.0 | 10.3 |
| NSP | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1561 | 1551 | 1463 | 1358 | 1157 | 7090 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance

Tableau 4.2.2.16.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins par milieu de résidence.

| Capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Oui, sans problème | 84.7 | 81.1 | 83.3 | 83.3 |
| Oui, avec difficulté | 6.1 | 10.9 | 10.8 | 9.7 |
| Non | 9.2 | 7.6 | 5.6 | 6.7 |
| NSP | | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 988 | 1143 | 4959 | 7090 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins

Tableau 4.2.2.17.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins par sexe.

| Capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins | Sexe | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Oui, sans problème | 85.6 | 81.2 | 83.3 |
| Oui, avec difficulté | 8.5 | 10.8 | 9.7 |
| Non | 5.7 | 7.7 | 6.7 |
| NSP | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3039 | 4051 | 7090 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins

Tableau 4.2.2.18.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins par tranche d'âge.

| Capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Oui, sans problème | 90.2 | 87.8 | 79.1 | 55.5 | 83.3 |
| Oui, avec difficulté | 4.5 | 6.1 | 13.6 | 30.4 | 9.7 |
| Non | 5.1 | 5.7 | 7.1 | 13.9 | 6.7 |
| NSP | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2668 | 1986 | 1181 | 1255 | 7090 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins

4.3. Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête et utilisation des services de santé

4.3.1. Maladies ou blessures

Tableau 4.3.1.1.

Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par milieu de résidence.

| Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête | 14.5 | 10.7 | 11.1 | 11.8 |
| Echantillon | 4476 | 5432 | 23099 | 33007 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.1.2.

Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par département géographique.

| Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête | Département géographique | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête | 10.8 | 15.8 | 17.9 | 10.2 | 4.3 |
| Echantillon | 8423 | 2584 | 3754 | 1948 | 3934 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.1.2. (suite)

| Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête | Département géographique | | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête | 18.9 | 13.8 | 13.2 | 8.9 | 11.8 |
| Echantillon | 2791 | 3215 | 3344 | 3014 | 33007 |

Tableau 4.3.1.3.

Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par sexe.

| Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête | Sexe | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête | 10.4 | 13.1 | 11.8 |
| Echantillon | 15959 | 17048 | 33007 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.1.4.

Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par tranche d'âge.

| Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête | Tranche d'âge | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 0- 14 ans | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus |
| Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête | 9.9 | 9.4 | 12.6 | 14.4 | 23.5 |
| Echantillon | 12933 | 8615 | 5029 | 3422 | 3008 |
| | | | | | 11.8 |
| | | | | | 33007 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.1.5.

Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par niveau d'étude atteint.

| Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête | Niveau d'étude atteint | | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|--------------------|----------|
| | Aucun niveau | Primaire | Secondaire | Études supérieures | |
| Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête | 13.5 | 9.9 | 10.4 | 10.0 | 11.8 |
| Echantillon | 17347 | 10905 | 4538 | 217 | 33007 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.1.6.

Proportion la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par situation d'activité.

| Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête | Situation d'activité | | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|
| | Actifs occupés | Chômeurs | Inactifs | Hors population en âge de travailler | |
| Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête | 12.3 | 13.1 | 10.8 | 12.1 | 11.8 |
| Echantillon | 9201 | 2903 | 12425 | 8478 | 33007 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.1.7

Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par quintile du revenu total du ménage.

| Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) |
| Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête | 13.5 | 12.3 | 10.1 | 11.0 | 12.3 |
| Echantillon | 6332 | 6546 | 6743 | 6845 | 6541 |
| | | | | | 33007 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.1.8.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée selon le type de problème (maladie ou blessure) survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête par milieu de résidence.

| Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Maladie | 95.9 | 97.9 | 95.7 | 96.0 |
| Blessure | 4.1 | 1.8 | 4.3 | 4.0 |
| NSP | - | 0.3 | - | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 638 | 625 | 2723 | 3986 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 27 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de problème de santé

Tableau 4.3.1.9.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée selon le type de problème (maladie ou blessure) survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête par département géographique.

| Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête | Département géographique | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Maladie | 95.5 | 94.0 | 97.6 | 97.6 | 90.3 |
| Blessure | 4.5 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 9.1 |
| NSP | - | - | - | - | 0.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 826 | 421 | 670 | 203 | 174 |

Tableau 4.3.1.9. (suite)

| Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête | Département géographique | | | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | Ensemble | |
| Maladie | 97.5 | 95.6 | 98.7 | 95.0 | 96.0 | 96.0 |
| Blessure | 2.5 | 4.4 | 1.3 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| NSP | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 516 | 452 | 441 | 283 | 3986 | 3986 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

27 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de problème de santé

Tableau 4.3.1.10.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée selon le type de problème (maladie ou blessure) survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête par sexe.

| Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête | Sexe | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Maladie | 94.7 | 96.9 | 96.0 |
| Blessure | 5.3 | 3.0 | 4.0 |
| NSP | - | 0.1 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1715 | 2271 | 3986 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

27 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de problème de santé

Tableau 4.3.1.11.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée selon le type de problème (maladie ou blessure) survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête par tranche d'âge.

| Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête | Tranche d'âge | | | | | 60 ans et plus | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|----------|
| | 0- 14 | 15- 29 | 30- 44 | 45- 59 | 60 ans et plus | | |
| Maladie | 96.9 | 94.1 | 97.7 | 94.3 | 96.2 | 96.0 | 96.0 |
| Blessure | 3.1 | 5.9 | 2.3 | 5.7 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
| NSP | - | - | - | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1239 | 820 | 661 | 523 | 743 | 3986 | 3986 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

27 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de problème de santé

Tableau 4.3.1.12.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée selon le type de problème (maladie ou blessure) survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête par situation d'activité.

| Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête | Actifs occupés | Situation d'activité | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| | | Chômeurs | Inactifs | Hors population en âge de travailler | |
| Maladie | 95.9 | 93.9 | 96.0 | 97.1 | 96.0 |
| Blessure | 4.1 | 6.1 | 3.9 | 2.9 | 4.0 |
| NSP | - | - | 0.1 | - | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1258 | 367 | 1372 | 989 | 3986 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

27 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de problème de santé

Tableau 4.3.1.13.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée selon le type de problème (maladie ou blessure) survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête par quintile de revenu total du ménage.

| Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Maladie | 96.6 | 94.3 | 97.0 | 95.4 | 96.7 | 96.0 |
| Blessure | 3.2 | 5.7 | 3.0 | 4.6 | 3.3 | 4.0 |
| NSP | 0.2 | - | - | - | - | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 889 | 874 | 696 | 774 | 753 | 3986 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

27 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de problème de santé

Tableau 4.3.1.14.

Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées pendant 3 jours au moins par milieu de résidence.

| Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées | 29.8 | 60.3 | 69.0 | 57.1 |
| Echantillon | 649 | 629 | 2735 | 4013 |

IHS/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Lire : Pour 57.2% de la population malade ou blessée, l'occurrence de la maladie ou de la blessure a eu des incidences sur l'exercice des activités habituelles pendant 3 jours au moins.

Tableau 4.3.1.15

Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées pendant 3 jours au moins par département géographique.

| Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours | Département géographique | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées | 37.9 | 65.6 | 59.3 | 66.5 | 42.1 |
| Echantillon | 838 | 422 | 675 | 204 | 175 |

Tableau 4.3.1.15 (suite)

| Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours | Département géographique | | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées | 78.8 | 67.1 | 73.4 | 79.5 | 57.1 |
| Echantillon | 519 | 452 | 445 | 283 | 4013 |

IHS/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) Lire : Pour 57.2% de la population malade ou blessée, l'occurrence de la maladie ou de la blessure a eu des incidences sur l'exercice des activités habituelles pendant 3 jours au moins.

Tableau 4.3.1.16

Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées pendant 3 jours au moins par sexe.

| Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours | Sexe | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées | 58.1 | 56.3 | 57.1 |
| Echantillon | 1725 | 2288 | 4013 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) Lire : Pour 57.2% de la population malade ou blessée, l'occurrence de la maladie ou de la blessure a eu des incidences sur l'exercice des activités habituelles pendant 3 jours au moins.

Tableau 4.3.1.17

Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées pendant 3 jours au moins par tranche d'âge.

| Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours | Tranche d'âge | | | | | 60 ans et plus | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|
| | 0- 14 ans | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | | |
| Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées | 55.0 | 51.3 | 53.7 | 59.2 | 69.7 | 57.1 | 57.1 |
| Echantillon | 1254 | 828 | 662 | 523 | 746 | 4013 | 4013 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) Lire : Pour 57.2% de la population malade ou blessée, l'occurrence de la maladie ou de la blessure a eu des incidences sur l'exercice des activités habituelles pendant 3 jours au moins.

Tableau 4.3.1.18.

Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées pendant 3 jours au moins par situation d'activité.

| Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours | Situation d'activité | | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|
| | Actifs occupés | Chômeurs | Inactifs | Hors population en âge de travailler | |
| Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées | 57.9 | 39.6 | 64.0 | 54.9 | 57.1 |
| Echantillon | 1259 | 372 | 1383 | 999 | 4013 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Lire : Pour 57.2% de la population malade ou blessée, l'occurrence de la maladie ou de la blessure a eu des incidences sur l'exercice des activités habituelles pendant 3 jours au moins.

Tableau 4.3.1.19.

Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées pendant 3 jours au moins par Quintile du revenu total du ménage.

| Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées | 61.1 | 64.3 | 62.1 | 60.5 | 42.4 | 57.1 |
| Echantillon | 879 | 843 | 708 | 782 | 801 | 4013 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) Lire : Pour 57.2% de la population malade ou blessée, l'occurrence de la maladie ou de la blessure a eu des incidences sur l'exercice des activités habituelles pendant 3 jours au moins.

Tableau 4.3.1.20.

Proportion de RSI ayant été affectés par l'une des maladies suivantes au cours des deux semaines précédant l'enquête par milieu de résidence.

| Maladie | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Fièvre, malaria | 29.2 | 31.1 | 34.0 | 32.5 |
| Diarrhée | 0.8 | 5.0 | 3.8 | 3.3 |
| Rhume | 11.8 | 21.3 | 16.0 | 15.9 |
| Grippe | 18.4 | 22.8 | 22.3 | 21.5 |
| Problèmes au dos | 14.5 | 18.6 | 28.0 | 23.6 |
| Autres | 56.2 | 61.2 | 59.7 | 59.1 |
| Echantillon | 201 | 270 | 1157 | 1628 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Les pourcentages ne se cumulent pas.

Lire : 29.2% des RSI vivant dans l'Aire Métropolitaine ont eu la fièvre ou la malaria au cours des deux semaines précédant l'enquête

Tableau 4.3.1.21.

Proportion de RSI ayant été affectés par l'une des maladies suivantes au cours des deux semaines précédant l'enquête par sexe.

| Maladie | Sexe | | Ensemble |
|------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Fièvre, malaria | 31.7 | 33.0 | 32.5 |
| Diarrhée | 2.5 | 3.9 | 3.3 |
| Rhume | 16.7 | 15.4 | 15.9 |
| Grippe | 22.3 | 21.0 | 21.5 |
| Problèmes au dos | 26.4 | 21.6 | 23.6 |
| Autres | 53.4 | 63.1 | 59.1 |
| Echantillon | 596 | 1032 | 1628 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) Lire : 31.7% des RSI de sexe masculin ont eu la fièvre ou la malaria au cours des deux semaines précédant l'enquête

Tableau 4.3.1.22.

Proportion de RSI ayant été affectés par l'une des maladies suivantes au cours des deux semaines précédant l'enquête par tranche d'âge.

| Maladie | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans ou plus | |
| Fièvre, malaria | 39.5 | 36.4 | 24.7 | 22.7 | 32.5 |
| Diarrhée | 2.7 | 4.5 | 2.9 | 3.5 | 3.3 |
| Rhume | 16.8 | 16.8 | 15.4 | 14.0 | 15.9 |
| Grippe | 22.8 | 23.0 | 23.3 | 16.5 | 21.5 |
| Problèmes au dos | 13.3 | 20.9 | 28.0 | 40.0 | 23.6 |
| Autres | 52.8 | 58.7 | 62.3 | 67.7 | 59.1 |
| Echantillon | 469 | 401 | 296 | 462 | 1628 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Lire : 39.5% des RSI de 15-29 ans ont eu la fièvre ou la malaria au cours des deux semaines précédant l'enquête.

Tableau 4.3.1.23.

Proportion de RSI ayant été affectés par l'une des maladies suivantes au cours des deux semaines précédant l'enquête par quintile du revenu total du ménage.

| Maladie | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Fièvre, malaria | 31.4 | 35.2 | 32.6 | 33.2 | 30.7 | 32.5 |
| Diarrhée | 3.7 | 4.2 | 2.4 | 4.1 | 2.5 | 3.3 |
| Rhume | 10.7 | 18.4 | 14.8 | 16.6 | 18.4 | 15.9 |
| Grippe | 17.7 | 24.8 | 19.8 | 21.0 | 23.5 | 21.5 |
| Problèmes au dos | 26.1 | 25.7 | 17.2 | 27.5 | 21.5 | 23.6 |
| Autres | 63.4 | 55.5 | 64.2 | 56.9 | 56.6 | 59.1 |
| Echantillon | 444 | 356 | 286 | 265 | 277 | 1628 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH).

Lire 31.4% des RSI les plus pauvres ont eu la fièvre ou la malaria au cours des deux semaines précédant l'enquête.

4.3.2. Utilisation des services de santé

Tableau 4.3.2.1.

Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé par milieu de résidence.

| Consultation d'un personnel de Santé | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé | 38.5 | 63.8 | 51.0 | 49.1 |
| Echantillon | 649 | 629 | 2735 | 4013 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.2.2.

Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé par département géographique.

| Consultation d'un personnel de Santé | Département géographique | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé | 41.6 | 44.0 | 56.8 | 44.0 | 45.1 |
| Echantillon | 838 | 422 | 675 | 204 | 175 |

Tableau 4.3.2.2. (suite)

| Consultation d'un personnel de Santé | Département géographique | | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé | 58.7 | 53.8 | 52.3 | 55.2 | 49.1 |
| Echantillon | 519 | 452 | 445 | 283 | 4013 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.2.3.

Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé par sexe.

| Consultation d'un personnel de Santé | Sexe | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé | 48.7 | 49.4 | 49.1 |
| Echantillon | 1725 | 2288 | 4013 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.2.4.

Proportion de la population malade ou blessée en pourcentage (%) ayant consulté un personnel de santé par tranche d'âge.

| Consultation d'un personnel de Santé | Tranche d'âge | | | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 0- 14 ans | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé | 53.0 | 42.1 | 48.2 | 49.2 | 51.3 | 49.1 |
| Echantillon | 1254 | 828 | 662 | 523 | 746 | 4013 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.2.5.

Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé par quintile du revenu total du ménage.

| Consultation d'un personnel de Santé | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé | 43.9 | 48.0 | 50.2 | 56.3 | 47.6 | 49.1 |
| Echantillon | 879 | 843 | 708 | 782 | 801 | 4013 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.2.6.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée n'ayant consulté aucun personnel de santé selon la raison de la non-consultation par milieu de résidence.

| Raison de la non-consultation | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Maladie ou blessure sans gravité | 44.6 | 29.8 | 22.9 | 30.7 |
| N'aurait pas pu payer le traitement | 32.7 | 45.1 | 53.3 | 45.8 |
| Aucun centre de santé de qualité dans la zone | | 0.4 | 3.5 | 2.0 |
| Automédication (soins traditionnels) | 12.7 | 17.7 | 25.2 | 20.4 |
| Automédication (achat de médicaments sans ordonnance) | 14.0 | 10.1 | 7.5 | 9.9 |
| Trop de travail, trop occupé | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.2 |
| Autres | 12.5 | 13.9 | 16.3 | 14.9 |
| NSP | 0.5 | | 0.1 | 0.2 |
| Echantillon | 393 | 215 | 1310 | 1918 |

IHS/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Question à Réponses Multiples. Le total peut excéder 100. 12 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant les raisons de la non-consultation d'un personnel de santé

Tableau 4.3.2.7.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée n'ayant consulté aucun personnel de santé selon la raison de la non-consultation par sexe.

| Raisons de la non-consultation | Sexe | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Maladie ou blessure sans gravité | 31.6 | 30.0 | 30.7 |
| N'aurait pas pu payer le traitement | 45.3 | 46.1 | 45.8 |
| Aucun centre de santé de qualité dans la zone | 2.6 | 1.6 | 2.0 |
| Automédication (soins traditionnels) | 21.1 | 19.9 | 20.4 |
| Automédication (achat de médicaments sans ordonnance) | 9.4 | 10.3 | 9.9 |
| Trop de travail, trop occupé | 0.8 | 1.4 | 1.2 |
| Autres | 13.9 | 15.5 | 14.9 |
| NSP | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Echantillon | 828 | 1090 | 1918 |

IHS/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Question à Réponses Multiples. Le total peut excéder 100. 12 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant les raisons de la non-consultation d'un personnel de santé

Tableau 4.3.2.8.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée n'ayant consulté aucun personnel de santé selon la raison de la non-consultation par tranche d'âge.

| Raison de la non-consultation | Tranche d'âge | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------------|
| | 0- 14 | 15- 29 | 30- 44 | 45- 59 | 60 ans et plus |
| Maladie ou blessure sans gravité | 30.1 | 43.3 | 27.8 | 27.6 | 18.4 |
| N'aurait pas pu payer le traitement | 46.9 | 35.1 | 44.1 | 48.1 | 59.4 |
| Aucun centre de santé de qualité dans la zone | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 3.2 |
| Automédication (soins traditionnels) | 21.8 | 15.4 | 20.6 | 22.7 | 23.5 |
| Automédication (achat de médicaments sans ordonnance) | 10.0 | 11.9 | 9.4 | 10.1 | 7.2 |
| Trop de travail, trop occupé | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 1.9 |
| Autres | 13.3 | 13.7 | 16.9 | 13.9 | 18.0 |
| NSP | 0.3 | 0.3 | | | 0.3 |
| Echantillon | 564 | 431 | 334 | 252 | 337 |
| | | | | | 1918 |

IHS/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Question à Réponses Multiples. Le total peut excéder 100. 12 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant les raisons de la non-consultation d'un personnel de santé

Tableau 4.3.2.9.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée n'ayant consulté aucun personnel de santé selon la raison de la non-consultation par quintile du revenu total du ménage.

| Raisons de la non-consultation | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) |
| Maladie ou blessure sans gravité | 23.2 | 19.7 | 24.0 | 25.8 | 54.9 |
| N'aurait pas pu payer le traitement | 58.8 | 55.4 | 51.0 | 40.8 | 25.6 |
| Aucun centre de santé de qualité dans la zone | 1.7 | 5.0 | 2.7 | 1.2 | 0.1 |
| Automédication (soins traditionnels) | 20.6 | 23.4 | 25.6 | 24.3 | 11.3 |
| Automédication (achat de médicaments sans ordonnance) | 5.2 | 6.2 | 9.2 | 12.0 | 16.3 |
| Trop de travail, trop occupé | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |
| Autres | 17.6 | 15.4 | 15.5 | 14.5 | 11.7 |
| NSP | 0.2 | | | 0.5 | 0.3 |
| Echantillon | 495 | 427 | 334 | 315 | 347 |
| | | | | | 1918 |

IHS/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Question à Réponses Multiples. Le total peut excéder 100. 12 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant les raisons de la non-consultation d'un personnel de santé.

Tableau 4.3.2.10.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de personnel de santé rencontré par milieu de résidence.

| Type de personnel de santé rencontré | Milieu de résidence | | | | Ensemble |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | | |
| Médecin généraliste, spécialiste | 94.8 | 81.7 | 62.2 | 72.4 | |
| Infirmière, Pharmacien | 1.9 | 15.3 | 27.0 | 19.7 | |
| Doktè-fèy, Houngan/manbo | 1.5 | 1.6 | 4.5 | 3.4 | |
| Parent, voisin | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | |
| Sage-femme, matrone, autres | 0.4 | 0.3 | 4.6 | 3.0 | |
| NSP | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Echantillon | 235 | 400 | 1373 | 2008 | |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

37 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de personnel de santé rencontré

Tableau 4.3.2.11.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de personnel de santé rencontré par département géographique.

| Type de personnel de santé rencontré | Département géographique | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|--|--|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite | | |
| Médecin généraliste, spécialiste | 86.8 | 65.2 | 77.7 | 94.6 | 70.9 | | |
| Infirmière, Pharmacien | 7.5 | 24.5 | 14.2 | 5.4 | 14.3 | | |
| Doktè-fèy, Houngan/manbo | 2.7 | 6.3 | 2.2 | | 3.7 | | |
| Parent, voisin | 0.6 | 0.6 | 2.8 | | 1.4 | | |
| Sage-femme, matrone, autres | 1.8 | 3.4 | 1.4 | | 9.7 | | |
| NSP | 0.6 | | 1.7 | | | | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| Echantillon | 337 | 195 | 383 | 80 | 79 | | |

Tableau 4.3.2.11. (suite)

| Type de personnel de santé rencontré | Département géographique | | | | | Ensemble |
|--------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|-------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | | |
| Médecin généraliste, spécialiste | 56.0 | 63.1 | 62.2 | 56.6 | 72.4 | |
| Infirmière, Pharmacien | 36.1 | 34.5 | 23.9 | 29.9 | 19.7 | |
| Doktè-fèy, Houngan/manbo | 4.3 | 1.1 | 4.3 | 9.4 | 3.4 | |
| Parent, voisin | 0.6 | 0.1 | | 2.5 | 1.0 | |
| Sage-femme, matrone, autres | 2.7 | 1.2 | 9.6 | 1.6 | 3.0 | |
| NSP | 0.3 | | | | 0.5 | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Echantillon | 298 | 242 | 235 | 159 | 2008 | |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

37 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de personnel de santé rencontré

Tableau 4.3.2.12.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de personnel de santé rencontré par sexe.

| Type de personnel de santé rencontré | Sexe | | Ensemble |
|--------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Médecin généraliste/ spécialiste | 69.6 | 74.4 | 72.4 |
| Infirmière/ Pharmacien | 21.9 | 18.1 | 19.7 |
| Doktè-fèy/ Houngan/manbo | 4.0 | 2.9 | 3.4 |
| Parent/ voisin | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| Sage-femme/ Matrone ou autres | 3.4 | 2.7 | 3.0 |
| NSP | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 862 | 1146 | 2008 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
37 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de personnel de santé rencontré

Tableau 4.3.2.13.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de personnel de santé rencontré par tranche d'âge.

| Type de personnel de santé rencontré | Tranche d'âge | | | | | Ensemble |
|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 0- 14 ans | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Médecin généraliste/ spécialiste | 69.6 | 70.5 | 76.5 | 75.4 | 73.9 | 72.4 |
| Infirmière/ Pharmacien | 26.3 | 19.6 | 14.1 | 17.0 | 14.0 | 19.7 |
| Doktè-fèy/ Houngan/manbo | 1.5 | 5.3 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 3.4 |
| Parent/ voisin | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 1.0 |
| Sage-femme/ Matrone ou autres | 1.9 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 4.5 | 3.0 |
| NSP | - | - | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.5 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 661 | 376 | 316 | 262 | 393 | 2008 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
37 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de personnel de santé rencontré

Tableau 4.3.2.14.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de personnel de santé rencontré par quintile du revenu total du ménage.

| Type de personnel de santé rencontré | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Médecin généraliste/ spécialiste | 67.2 | 65.3 | 71.4 | 73.4 | 82.0 | 72.4 |
| Infirmière/ Pharmacien | 18.6 | 25.0 | 19.9 | 21.1 | 14.5 | 19.7 |
| Doktè-fèy/ Houngan/manbo | 3.4 | 3.2 | 6.3 | 3.7 | 1.0 | 3.4 |
| Parent/ voisin | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.0 |
| Sage-femme/ Matrone ou autres | 9.0 | 4.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 3.0 |
| NSP | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 382 | 427 | 355 | 451 | 393 | 2008 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
37 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de personnel de santé rencontré

Tableau 4.3.2.15.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de service de santé par milieu de résidence.

| Type de service de santé | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Hôpital privé | 44.8 | 36.3 | 25.8 | 31.6 |
| Hôpital public | 15.5 | 31.0 | 25.3 | 24.1 |
| Dispensaire/ Centre de santé | 17.0 | 19.1 | 31.4 | 26.3 |
| Clinique privée/ Domicile du soignant | 19.8 | 10.8 | 10.8 | 12.8 |
| Autre | 2.5 | 2.8 | 6.5 | 5.0 |
| NSP | 0.4 | | 0.2 | 0.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 234 | 402 | 1366 | 2002 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

43 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de service de santé utilisé

Tableau 4.3.2.16.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de service de santé par département géographique.

| Type de service de santé | Département géographique | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Hôpital privé | 41.5 | 24.6 | 42.8 | 24.4 | 41.4 |
| Hôpital public | 16.5 | 19.8 | 28.3 | 55.4 | 19.0 |
| Dispensaire/ Centre de santé | 19.3 | 36.2 | 15.5 | 14.9 | 16.7 |
| Clinique privée/ Domicile du soignant | 17.9 | 12.6 | 9.2 | 3.8 | 13.2 |
| Autre | 4.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 9.7 |
| NSP | 0.3 | - | 0.6 | - | - |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 331 | 196 | 384 | 79 | 79 |

Tableau 4.3.2.16. (suite)

| Type de service de santé | Département géographique | | | | Ensemble |
|---------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Hôpital privé | 14.2 | 22.1 | 19.1 | 30.0 | 31.6 |
| Hôpital public | 31.0 | 27.4 | 24.0 | 23.3 | 24.1 |
| Dispensaire/ Centre de santé | 45.6 | 30.4 | 33.6 | 31.4 | 26.3 |
| Clinique privée/ Domicile du soignant | 7.4 | 14.6 | 13.3 | 10.4 | 12.8 |
| Autre | 1.8 | 5.5 | 10.0 | 4.9 | 5.0 |
| NSP | - | - | - | - | 0.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 299 | 242 | 233 | 159 | 2002 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) 43 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de service de santé utilisé

Tableau 4.3.2.17.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de service de santé par sexe.

| Type de service de santé | Sexe | | Ensemble |
|---------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Hôpital privé | 32.3 | 31.0 | 31.6 |
| Hôpital public | 23.2 | 24.8 | 24.1 |
| Dispensaire/ Centre de santé | 28.5 | 24.7 | 26.3 |
| Clinique privée/ Domicile du soignant | 9.9 | 14.9 | 12.8 |
| Autre | 5.7 | 4.6 | 5.0 |
| NSP | 0.4 | - | 0.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 860 | 1142 | 2002 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

43 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de service de santé utilisé

Tableau 4.3.2.18.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de service de santé par tranche d'âge.

| Type de service de santé | Tranche d'âge | | | | | Ensemble |
|---------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------------|----------|
| | 0- 14 | 15- 29 | 30- 44 | 45- 59 | 60 ans et plus | |
| Hôpital privé | 26.2 | 34.2 | 37.1 | 32.5 | 33.6 | 31.6 |
| Hôpital public | 19.7 | 25.5 | 27.1 | 27.6 | 26.0 | 24.1 |
| Dispensaire/ Centre de santé | 37.8 | 23.1 | 16.2 | 20.8 | 20.4 | 26.3 |
| Clinique privée/ Domicile du soignant | 13.1 | 11.5 | 13.9 | 13.1 | 12.3 | 12.8 |
| Autre | 3.2 | 5.7 | 4.8 | 5.9 | 7.5 | 5.0 |
| NSP | - | - | 0.8 | - | 0.3 | 0.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.1 | 100.0 |
| Echantillon | 658 | 373 | 317 | 262 | 392 | 2002 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

43 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de service de santé utilisé

Tableau 4.3.2.19.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de service de santé par quintile du revenu total du ménage.

| Type de service de santé | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Hôpital privé | 28.7 | 29.2 | 31.7 | 28.9 | 38.2 | 31.6 |
| Hôpital public | 24.9 | 24.3 | 28.7 | 26.7 | 17.5 | 24.1 |
| Dispensaire/ Centre de santé | 24.9 | 31.6 | 21.8 | 34.1 | 18.6 | 26.3 |
| Clinique privée/ Domicile du soignant | 10.3 | 9.5 | 11.4 | 8.6 | 22.6 | 12.8 |
| Autre | 10.9 | 5.1 | 6.4 | 1.7 | 2.7 | 5.0 |
| NSP | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 382 | 428 | 354 | 446 | 392 | 2002 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
43 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de service de santé utilisé

Tableau 4.3.2.20.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon la localisation du service de santé par milieu de résidence.

| Localisation du service de santé | Milieu de résidence | | Ensemble |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Rural | |
| Ville /Quartier /Section communale de résidence | 93.0 | 81.6 | 81.4 |
| Autre commune | 5.8 | 17.7 | 17.8 |
| A l'étranger | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| NSP | 0.8 | - | 0.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 229 | 402 | 1359 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
55 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant la localisation du service de santé utilisé

Tableau 4.3.2.21.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon la localisation du service de santé par département géographique.

| Localisation du service de santé | Département géographique | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Ville /Quartier /Section communale de résidence | 91.1 | 77.3 | 65.5 | 70.3 | 93.9 |
| Autre commune | 7.7 | 20.5 | 33.5 | 28.5 | 6.1 |
| A l'étranger | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | |
| NSP | 0.8 | 0.7 | 0.3 | - | - |
| Echantillon | 327 | 192 | 384 | 78 | 79 |

Tableau 4.3.2.21. (suite)

| Localisation du service de santé | Département géographique | | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Ville /Quartier /Section communale de résidence | 89.4 | 73.8 | 80.2 | 83.3 | 81.4 |
| Autre commune | 10.0 | 26.2 | 19.4 | 16.7 | 17.8 |
| A l'étranger | 0.6 | | 0.4 | | 0.5 |
| NSP | - | - | - | - | 0.3 |
| Echantillon | 298 | 241 | 231 | 160 | 1990 |

55 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant la localisation du service de santé utilisé

Tableau 4.3.2.22.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon la localisation du service de santé par quintile du revenu total du ménage.

| Localisation du service de santé | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Ville /Quartier /Section communale de résidence | 78.8 | 76.6 | 79.3 | 84.1 | 86.4 | 81.4 |
| Autre commune | 20.7 | 23.0 | 20.0 | 15.2 | 12.1 | 17.8 |
| A l'étranger | - | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
| NSP | 0.5 | - | 0.3 | - | 0.8 | 0.3 |
| Echantillon | 380 | 427 | 349 | 445 | 389 | 1990 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

55 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant la localisation du service de santé utilisé

4.3.3. Appréciation des soins de santé

Tableau 4.3.3.1.

Proportion de RSI malades ou blessés ayant déclaré être très satisfaits ou un peu satisfaits des soins de santé reçus selon le type de service de santé consulté et le milieu de résidence.

| Type de service de santé | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Hôpital privé | 87.0 | 91.0 | 87.4 | 87.9 |
| Hôpital public | 80.9 | 90.1 | 87.1 | 86.9 |
| Dispensaire/ Centre de santé | 100.0 | 87.3 | 87.8 | 89.5 |
| Clinique privée/ Domicile du soignant | 94.1 | 83.5 | 80.8 | 85.6 |
| Autre | 100.0 | 78.1 | 86.0 | 86.8 |
| Echantillon | 233 | 402 | 1364 | 1999 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Lire: 87% des enquêtés de l'Aire Métropolitaine ayant utilisé les services d'un hôpital privé se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits

Tableau 4.3.3.2.

Proportion de RSI malades ou blessés ayant déclaré être très satisfaits ou un peu satisfaits des soins de santé reçus selon le type de service de santé consulté et le quintile du revenu total du ménage.

| Lieu de la consultation | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Hôpital privé | 87.5 | 85.9 | 88.0 | 90.0 | 87.9 | 87.9 |
| Hôpital public | 87.5 | 85.8 | 84.4 | 87.1 | 89.5 | 86.9 |
| Dispensaire/ Centre de santé | 86.7 | 92.0 | 90.7 | 86.3 | 92.8 | 89.5 |
| Clinique privée/ Domicile du soignant | 76.4 | 73.1 | 83.4 | 82.9 | 95.1 | 85.6 |
| Autre | 81.1 | 100.0 | 80.5 | 90.3 | 92.4 | 86.8 |
| Echantillon | 377 | 405 | 361 | 449 | 407 | 1999 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Lire: 92.8% des enquêtés du dernier quintile du revenu total du ménage ayant utilisé les services d'un dispensaire ou d'un centre de santé se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits. 4.4. Maladies des enfants de moins de 5 ans survenues au cours des 2 semaines précédant l'enquête

4.4 Maladies des enfants de moins de 5 ans au cours des 2 semaines précédents l'enquête et utilisation des services de santé

Tableau 4.4.1.

Proportion d'enfants de moins de 5 ans affectés par l'une des maladies suivantes ou victimes d'un accident au cours des deux semaines précédant l'enquête par milieu de résidence.

| Maladie/Accident | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Fièvre | 35.9 | 31.4 | 33.3 | 33.5 |
| Toux ou rhume | 42.8 | 38.2 | 31.8 | 35.1 |
| Diarrhée | 15.2 | 18.5 | 14.8 | 15.6 |
| Accident | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Autres | 1.2 | 5.8 | 5.4 | 4.6 |
| Echantillon | 407 | 815 | 2446 | 3668 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.4.2.

Proportion d'enfants de moins de 5 ans affectés par l'une des maladies suivantes ou victimes d'un accident au cours des deux semaines précédant l'enquête par département géographique.

| Maladie/Accident | Département géographique | | | | | Artibonite |
|------------------|--------------------------|---------|------|----------|--|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | | |
| Fièvre | 33.3 | 27.6 | 32.8 | 26.3 | | 23.7 |
| Toux ou rhume | 38.2 | 36.1 | 39.2 | 27.6 | | 8.1 |
| Diarrhée | 14.1 | 12.3 | 19.9 | 10.8 | | 9.5 |
| Accident | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | | 0.3 |
| Autres | 1.8 | 7.6 | 8.0 | 7.0 | | 2.1 |
| Echantillon | 730 | 343 | 401 | 271 | | 415 |

Tableau 4.4.2. (suite)

| Maladie/Accident | Centre | Département géographique | | | | Ensemble |
|------------------|--------|--------------------------|-------------|------------|--|----------|
| | | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | | |
| Fièvre | 41.7 | 38.6 | 36.0 | 45.5 | | 33.5 |
| Toux ou rhume | 42.5 | 45.9 | 35.6 | 47.8 | | 35.1 |
| Diarrhée | 28.0 | 12.1 | 16.7 | 22.2 | | 15.6 |
| Accident | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | | 0.5 |
| Autres | 4.8 | 4.5 | 8.1 | 7.4 | | 4.6 |
| Echantillon | 384 | 394 | 384 | 346 | | 3668 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.4.3.

Proportion d'enfants de moins de 5 ans affectés par l'une des maladies suivantes ou victimes d'un accident au cours des deux semaines précédant l'enquête par quintile du revenu total du ménage.

| Maladie/Accident | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Fièvre | 31.7 | 36.0 | 33.6 | 34.3 | 31.8 | 33.5 |
| Toux ou rhume | 30.7 | 35.7 | 35.1 | 34.0 | 39.4 | 35.1 |
| Diarrhée | 13.9 | 18.0 | 15.2 | 16.5 | 14.4 | 15.6 |
| Accident | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
| Autres | 4.9 | 5.3 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 4.6 |
| Echantillon | 749 | 780 | 779 | 732 | 628 | 3668 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.4.4.

Distribution des enfants de moins de 5 ans en pourcentage (%) tombés malades ou accidentés selon la maladie la plus récente ou l'accident le plus récent survenu(e) au cours des deux semaines précédant l'enquête par milieu de résidence.

| Maladie ou accident la/le plus récent/récente | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Fièvre | 35.4 | 24.6 | 35.8 | 33.6 |
| Toux ou rhume | 45.3 | 40.5 | 35.1 | 38.4 |
| Diarrhée | 18.3 | 28.2 | 22.1 | 22.4 |
| Accident | - | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| Autres | 1.0 | 6.0 | 6.7 | 5.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 175 | 363 | 1028 | 1566 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) L'information concernant la maladie ou l'accident le plus récent d'un des enfants de moins de 5 ans n'existe pas pour 265 cas

Tableau 4.4.5.

Distribution des enfants de moins de 5 ans en pourcentage (%) tombés malades ou accidentés selon le type de la maladie la plus récente ou de l'accident le plus récent survenu(e) au cours des deux semaines précédant l'enquête par quintile du revenu total du ménage.

| Maladie ou accident la/le plus récent/récente | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Fièvre | 39.4 | 31.6 | 32.7 | 34.0 | 31.6 | 33.6 |
| Toux ou rhume | 34.3 | 35.1 | 38.9 | 38.1 | 43.7 | 38.4 |
| Diarrhée | 19.9 | 25.1 | 21.5 | 24.3 | 21.2 | 22.4 |
| Accident | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| Autres | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 3.3 | 3.4 | 5.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 299 | 345 | 330 | 318 | 274 | 1566 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
L'information concernant la maladie ou l'accident le plus récent d'un des enfants de moins de 5 ans n'existe pas pour 265 cas

Tableau 4.4.6.

Proportion d'enfants de moins de 5 ans tombés malades ou accidentés au cours des deux semaines précédant l'enquête et ayant reçu un médicament d'un membre du ménage par milieu de résidence.

| Administration de médicaments à un enfant par un membre du ménage | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Proportion d'enfants malades de moins de cinq ans ayant reçu un médicament d'un membre du ménage | 58.5 | 69.8 | 71.2 | 68.2 |
| Echantillon | 208 | 428 | 1195 | 1831 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.4.7.

Proportion d'enfants de moins de 5 ans tombés malades ou accidentés au cours des deux semaines précédant l'enquête et ayant reçu un médicament d'un membre du ménage par quintile du revenu total du ménage.

| | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Administration de médicaments à un enfant par un membre du ménage | | | | | | |
| Proportion d'enfants malades de moins de cinq ans ayant reçu un médicament d'un membre du ménage | 63.5 | 70.8 | 72.1 | 68.4 | 65.6 | 68.2 |
| Echantillon | 348 | 407 | 388 | 367 | 321 | 1831 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

4.5. Autoévaluation de l'état de santé

Tableau 4.5.1.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon l'autoévaluation de l'état de santé général par milieu de résidence.

| Etat de santé général | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Bon / Très bon | 48.8 | 37.4 | 25.5 | 32.8 |
| Moyen | 40.9 | 42.8 | 51.5 | 47.7 |
| Mauvais | 8.8 | 14.9 | 16.2 | 14.3 |
| Très mauvais | 1.4 | 4.8 | 6.7 | 5.1 |
| NSP | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 990 | 1142 | 4957 | 7089 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur état de santé général

Tableau 4.5.2.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon l'autoévaluation de l'état de santé général par département géographique.

| Etat de santé général | Département géographique | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Bon / Très bon | 45.0 | 19.3 | 29.8 | 16.6 | 20.7 |
| Moyen | 42.0 | 59.5 | 43.7 | 46.6 | 57.5 |
| Mauvais | 10.0 | 17.5 | 17.8 | 22.3 | 14.5 |
| Très mauvais | 2.9 | 3.7 | 8.5 | 14.5 | 7.3 |
| NSP | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1919 | 559 | 725 | 373 | 895 |

Tableau 4.5.2. (suite)

| Etat de santé général | Département géographique | | | | Ensemble |
|-----------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Bon / Très bon | 24.1 | 33.5 | 20.1 | 32.5 | 32.8 |
| Moyen | 48.1 | 47.5 | 59.2 | 43.8 | 47.7 |
| Mauvais | 21.9 | 14.8 | 16.4 | 17.1 | 14.3 |
| Très mauvais | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 5.1 |
| NSP | - | - | 0.1 | - | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 593 | 675 | 689 | 661 | 7089 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur état de santé général

Tableau 4.5.3.

Distribution en pourcentage (%) des RSI
selon l'autoévaluation de l'état de santé général par sexe.

| Etat de santé général | Sexe | | Ensemble |
|-----------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Bon / Très bon | 39.4 | 26.7 | 32.8 |
| Moyen | 45.5 | 49.7 | 47.7 |
| Mauvais | 10.8 | 17.5 | 14.3 |
| Très mauvais | 4.2 | 6.0 | 5.1 |
| NSP | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3036 | 4053 | 7089 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur état de santé général

Tableau 4.5.4.

Distribution en pourcentage (%) des RSI
selon l'autoévaluation de l'état de santé général par tranche d'âge.

| Etat de santé général | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|-----------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Bon / Très bon | 48.6 | 29.1 | 13.7 | 4.8 | 32.8 |
| Moyen | 43.3 | 54.1 | 57.7 | 41.0 | 47.7 |
| Mauvais | 6.4 | 13.7 | 20.9 | 35.7 | 14.3 |
| Très mauvais | 1.7 | 2.9 | 7.7 | 18.4 | 5.1 |
| NSP | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2667 | 1983 | 1180 | 1259 | 7089 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur état de santé général

Tableau 4.5.5.

Distribution en pourcentage (%) des RSI
selon l'autoévaluation de l'état de santé général par situation d'activité.

| Etat de santé général | Situation d'activité | | | Ensemble |
|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|----------|
| | Actif occupé | Chômeur au sens du BIT | Inactif | |
| Bon / Très bon | 27.2 | 43.7 | 34.3 | 32.8 |
| Moyen | 53.0 | 44.7 | 43.6 | 47.7 |
| Mauvais | 14.9 | 9.4 | 15.5 | 14.3 |
| Très mauvais | 4.9 | 2.0 | 6.5 | 5.1 |
| NSP | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3372 | 856 | 2861 | 7089 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur état de santé général

Tableau 4.5.6.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon l'autoévaluation de l'état de santé général
par quintile du revenu total du ménage.

| Etat de santé général | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Bon / Très bon | 18.7 | 23.8 | 27.9 | 34.3 | 52.3 | 32.8 |
| Moyen | 50.3 | 54.0 | 51.5 | 49.6 | 36.3 | 47.7 |
| Mauvais | 21.6 | 16.3 | 15.2 | 12.4 | 8.4 | 14.3 |
| Très mauvais | 9.2 | 5.8 | 5.4 | 3.6 | 3.0 | 5.1 |
| NSP | 0.2 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1559 | 1550 | 1464 | 1358 | 1158 | 7089 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur état de santé général

Tableau 4.5.7

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon l'autoévaluation
de l'état de santé général par habitude tabagique.

| Etat de santé général | Tabagisme | | | Ensemble |
|-----------------------|------------------|------------------------|--------|----------|
| | Oui, chaque jour | Oui, occasionnellement | Jamais | |
| Bon/ Très bon | 20.0 | 19.5 | 34.8 | 32.8 |
| Moyen | 46.5 | 54.1 | 47.2 | 47.7 |
| Mauvais | 23.7 | 19.8 | 13.2 | 14.3 |
| Très mauvais | 9.9 | 6.5 | 4.7 | 5.1 |
| NSP | | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 537 | 590 | 5952 | 7079 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

4.6 Habitudes tabagiques, consommation d'alcool et de drogues

4.6.1. Habitudes tabagiques

Tableau 4.6.1.1.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon les habitudes tabagiques par milieu de résidence.

| Tabagisme | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Oui, chaque jour | 4.0 | 3.5 | 7.4 | 6.0 |
| Oui, occasionnellement | 8.5 | 5.0 | 7.5 | 7.4 |
| Jamais | 87.5 | 91.5 | 85.1 | 86.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 987 | 1143 | 4958 | 7088 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
13 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude tabagique

Tableau 4.6.1.2.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon les habitudes tabagiques par département géographique.

| Tabagisme | Département géographique | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Oui, chaque jour | 4.8 | 7.8 | 5.3 | 4.3 | 3.8 |
| Oui, occasionnellement | 7.9 | 9.8 | 3.5 | 7.9 | 7.3 |
| Jamais | 87.3 | 82.4 | 91.2 | 87.8 | 88.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1916 | 560 | 724 | 373 | 898 |

Tableau 4.6.1.2.(suite)

| Tabagisme | Département géographique | | | | Ensemble |
|------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Oui, chaque jour | 8.2 | 7.7 | 10.0 | 9.5 | 6.0 |
| Oui, occasionnellement | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 4.7 | 7.4 |
| Jamais | 80.8 | 86.3 | 81.0 | 85.8 | 86.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 592 | 675 | 689 | 661 | 7088 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
13 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude tabagique

Tableau 4.6.1.3.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon les habitudes tabagiques par sexe.

| Tabagisme | Sexe | | Ensemble |
|------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Oui, chaque jour | 8.8 | 3.4 | 6.0 |
| Oui, occasionnellement | 8.8 | 6.0 | 7.4 |
| Jamais | 82.4 | 90.6 | 86.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3038 | 4050 | 7088 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
13 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude tabagique

Tableau 4.6.1.4.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon les habitudes tabagiques par tranche d'âge.

| Tabagisme | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Oui, chaque jour | 1.2 | 5.8 | 12.6 | 16.0 | 6.0 |
| Oui, occasionnellement | 4.4 | 8.6 | 10.6 | 12.4 | 7.4 |
| Jamais | 94.4 | 85.6 | 76.8 | 71.6 | 86.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2668 | 1983 | 1180 | 1257 | 7088 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

13 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude tabagique

Tableau 4.6.1.5.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon les habitudes tabagiques par niveau d'étude atteint.

| Tabagisme | Niveau d'étude atteint | | | Ensemble |
|------------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Aucun niveau | Primaire | Secondaire/ Supérieur | |
| Oui, chaque jour | 10.5 | 3.7 | 2.5 | 6.0 |
| Oui, occasionnellement | 10.0 | 5.7 | 5.8 | 7.4 |
| Jamais | 79.5 | 90.6 | 91.7 | 86.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3375 | 2260 | 1453 | 7088 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

13 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude tabagique

Tableau 4.6.1.6.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon les habitudes tabagiques par quintile du revenu total du ménage.

| Tabagisme | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Oui, chaque jour | 7.2 | 7.7 | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 6.0 |
| Oui, occasionnellement | 8.6 | 7.3 | 8.9 | 7.1 | 5.6 | 7.4 |
| Jamais | 84.2 | 85.0 | 85.5 | 87.9 | 89.3 | 86.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1559 | 1551 | 1466 | 1356 | 1156 | 7088 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

13 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude tabagique

4.6.2. Consommation d'alcool

Tableau 4.6.2.1.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la consommation d'alcool par milieu de résidence.

| Consommation d'alcool | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Oui, une ou plusieurs fois par semaine | 2.9 | 1.4 | 4.8 | 3.9 |
| Oui, occasionnellement | 11.5 | 4.6 | 7.8 | 8.2 |
| Non, jamais | 85.5 | 94.0 | 87.4 | 87.9 |
| NSP | 0.1 | - | - | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 988 | 1142 | 4961 | 7091 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
 10 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude quant à la consommation d'alcool

Tbleau 4.6.2.2.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la consommation d'alcool par département géographique.

| Consommation d'alcool | Département géographique | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Oui, une ou plusieurs fois par semaine | 3.7 | 2.8 | 3.0 | 1.8 | 3.8 |
| Oui, occasionnellement | 10.4 | 8.4 | 4.1 | 5.5 | 5.7 |
| Non, jamais | 85.8 | 88.8 | 92.9 | 92.7 | 90.5 |
| NSP | 0.1 | | | | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1918 | 560 | 724 | 373 | 897 |

Tbleau 4.6.2.2. (suite)

| Consommation d'alcool | Département géographique | | | | Ensemble |
|----------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Oui, une ou plusieurs fois par semaine | 4.1 | 4.2 | 6.8 | 4.0 | 3.9 |
| Oui, occasionnellement | 7.8 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 8.2 |
| Non, jamais | 88.1 | 87.2 | 84.3 | 88.2 | 87.9 |
| NSP | - | - | - | - | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 593 | 675 | 690 | 661 | 7091 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
 10 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude quant à la consommation d'alcool

Tableau 4.6.2.3.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la consommation d'alcool par sexe.

| Consommation d'alcool | Sexe | | Ensemble |
|----------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Oui, une ou plusieurs fois par semaine | 6.6 | 1.3 | 3.9 |
| Oui, occasionnellement | 13.3 | 3.5 | 8.2 |
| Non, jamais | 80.0 | 95.2 | 87.9 |
| NSP | 0.1 | – | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3038 | 4053 | 7091 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 10 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude quant à la consommation d'alcool

Tableau 4.6.2.4.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la consommation d'alcool par tranche d'âge.

| Consommation d'alcool | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|----------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Oui, une ou plusieurs fois par semaine | 1.1 | 4.4 | 7.7 | 8.3 | 3.9 |
| Oui, occasionnellement | 6.7 | 9.1 | 8.7 | 11.5 | 8.2 |
| Non, jamais | 92.2 | 86.5 | 83.6 | 80.2 | 87.9 |
| NSP | 0.1 | – | – | – | 0.0 |
| Total | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2667 | 1986 | 1179 | 1259 | 7091 |

 IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
 10 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude quant à la consommation d'alcool

Tableau 4.6.2.5.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la consommation d'alcool par niveau d'étude atteint.

| Consommation d'alcool | Niveau d'étude atteint | | | Ensemble |
|----------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Aucun niveau | Primaire | Secondaire/ Supérieur | |
| Oui, une ou plusieurs fois par semaine | 6.1 | 2.8 | 2.1 | 3.9 |
| Oui, occasionnellement | 8.9 | 7.3 | 8.5 | 8.2 |
| Non, jamais | 85.0 | 89.9 | 89.3 | 87.9 |
| NSP | – | – | 0.1 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3378 | 2259 | 1454 | 7091 |

 IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
 10 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude quant à la consommation d'alcool

Tableau 4.6.2.6.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la consommation d'alcool par quintile du revenu du ménage.

| Consommation d'alcool | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Oui, une ou plusieurs fois par semaine | 3.5 | 4.7 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 |
| Oui, occasionnellement | 6.9 | 7.3 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 8.2 |
| Non, jamais | 89.6 | 88.0 | 87.6 | 87.6 | 87.2 | 87.9 |
| NSP | — | — | — | — | 0.1 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1561 | 1550 | 1466 | 1356 | 1158 | 7091 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

10 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude quant à la consommation d'alcool

4.6.3. Consommation de drogue

Tableau 4.6.3.1.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la connaissance d'un consommateur de drogue par milieu de résidence.

| Connaît un consommateur de drogue | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Oui | 6.5 | 8.2 | 5.4 | 6.1 |
| Non | 86.6 | 91.7 | 94.0 | 91.9 |
| NSP | 6.9 | 0.1 | 0.6 | 2.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 979 | 1136 | 4922 | 7037 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

64 RSI n'ont pas répondu à la question à savoir s'ils connaissaient un consommateur de drogue

Tableau 4.6.3.2.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la connaissance d'un consommateur de drogue par département géographique.

| Connaît un consommateur de drogue | Département géographique | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Oui | 6.0 | 5.1 | 6.9 | 0.8 | 4.9 |
| Non | 89.4 | 94.2 | 92.5 | 99.2 | 95.0 |
| NSP | 4.6 | 0.7 | 0.6 | | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1902 | 555 | 721 | 367 | 892 |

Tableau 4.6.3.2. (suite)

| Connaît un consommateur de drogue | Département géographique | | | | Ensemble |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Oui | 2.0 | 6.5 | 12.5 | 6.7 | 6.1 |
| Non | 97.7 | 93.3 | 86.8 | 93.2 | 91.9 |
| NSP | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 2.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 590 | 667 | 688 | 655 | 7037 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

64 RSI n'ont pas répondu à la question à savoir s'ils connaissaient un consommateur de drogue

Tableau 4.6.3.3.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la connaissance d'un consommateur de drogue par sexe.

| Connaît un consommateur de drogue | Sexe | | Ensemble |
|-----------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Oui | 7.9 | 4.5 | 6.1 |
| Non | 90.7 | 93.0 | 91.9 |
| NSP | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
| Total | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3014 | 4023 | 7037 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 64 RSI n'ont pas répondu à la question à savoir s'ils connaissaient un consommateur de drogue

Tableau 4.6.3.4.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la connaissance d'un consommateur de drogue par tranche d'âge.

| Connaît un consommateur de drogue | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Oui | 7.8 | 5.7 | 4.4 | 2.6 | 6.1 |
| Non | 90.2 | 92.3 | 93.0 | 96.1 | 91.9 |
| NSP | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 1.3 | 2.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2645 | 1973 | 1169 | 1250 | 7037 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
64 RSI n'ont pas répondu à la question à savoir s'ils connaissaient un consommateur de drogue

Tableau 4.6.3.5.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la connaissance d'un consommateur de drogue par niveau d'étude atteint.

| Connaît un consommateur de drogue | Niveau d'étude atteint | | | Ensemble |
|-----------------------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|
| | Aucun niveau | Primaire | Secondaire/Supérieur | |
| Oui | 3.6 | 7.4 | 7.9 | 6.1 |
| Non | 95.1 | 91.3 | 88.1 | 91.9 |
| NSP | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 2.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3350 | 2242 | 1445 | 7037 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
64 RSI n'ont pas répondu à la question à savoir s'ils connaissaient un consommateur de drogue

Tableau 4.6.3.6.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la connaissance d'un consommateur de drogue par quintile du revenu total du ménage.

| Connaît un consommateur de drogue | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Oui | 3.3 | 5.0 | 4.7 | 8.2 | 8.2 | 6.1 |
| Non | 95.6 | 92.7 | 91.8 | 89.5 | 90.9 | 91.9 |
| NSP | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 0.9 | 2.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1544 | 1544 | 1458 | 1345 | 1146 | 7037 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
64 RSI n'ont pas répondu à la question à savoir s'ils connaissaient un consommateur de drogue

4.7. Santé mentale des personnes de 15 ans et plus (détresse psychologique)

Tableau 4.7.1.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de la nervosité ressentie par milieu de résidence.

| Intensité de la nervosité ressentie | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Forte | 10.1 | 9.8 | 15.5 | 13.4 |
| Modérée | 26.1 | 25.9 | 24.9 | 25.3 |
| Faible | 18.7 | 11.6 | 14.6 | 15.1 |
| Nulle | 45.1 | 52.7 | 45.0 | 46.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 983 | 1142 | 4955 | 7080 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

21 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la nervosité ressentie

Tableau 4.7.2.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de la nervosité ressentie par département géographique.

| Intensité de la nervosité ressentie | Département géographique | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Forte | 11.6 | 15.4 | 16.2 | 9.2 | 14.9 |
| Modérée | 27.0 | 12.7 | 25.5 | 32.7 | 30.8 |
| Faible | 15.3 | 10.1 | 17.6 | 7.0 | 13.3 |
| Nulle | 46.1 | 61.8 | 40.7 | 51.1 | 41.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1910 | 556 | 726 | 373 | 898 |

Tableau 4.7.2. (suite)

| Intensité de la nervosité ressentie | Département géographique | | | | Ensemble |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Forte | 10.2 | 13.1 | 19.2 | 13.0 | 13.4 |
| Modérée | 26.0 | 10.1 | 23.4 | 33.1 | 25.3 |
| Faible | 20.4 | 13.2 | 13.9 | 21.5 | 15.1 |
| Nulle | 43.4 | 63.6 | 43.5 | 32.4 | 46.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 593 | 675 | 689 | 660 | 7080 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

21 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la nervosité ressentie

Tableau 4.7.3.

Distribution des RSI en pourcentage (%)
selon l'intensité de la nervosité ressentie par sexe.

| Intensité de la nervosité ressentie | Sexe | | Ensemble |
|-------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Forte | 11.1 | 15.5 | 13.4 |
| Modérée | 23.6 | 27.0 | 25.3 |
| Faible | 14.4 | 15.7 | 15.1 |
| Nulle | 50.9 | 41.8 | 46.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3035 | 4045 | 7080 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
21 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la nervosité ressentie

Tableau 4.7.4.

Distribution des RSI en pourcentage (%)
selon l'intensité de la nervosité ressentie par tranche d'âge.

| Intensité de la nervosité ressentie | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Forte | 8.6 | 13.7 | 16.7 | 26.3 | 13.4 |
| Modérée | 21.7 | 27.4 | 29.2 | 30.3 | 25.3 |
| Faible | 13.3 | 16.8 | 18.0 | 15.0 | 15.1 |
| Nulle | 56.4 | 42.1 | 36.1 | 28.4 | 46.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2665 | 1982 | 1177 | 1256 | 7080 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
21 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la nervosité ressentie

Tableau 4.7.5.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de la nervosité ressentie par niveau d'étude atteint.

| Intensité de la nervosité ressentie | Niveau d'étude atteint | | | Ensemble |
|-------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Aucun niveau | Primaire | Secondaire/ Supérieur | |
| Forte | 19.5 | 10.5 | 8.5 | 13.4 |
| Modérée | 27.7 | 24.6 | 23.0 | 25.3 |
| Faible | 15.8 | 14.5 | 14.8 | 15.1 |
| Nulle | 37.0 | 50.4 | 53.8 | 46.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3372 | 2257 | 1451 | 7080 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
21 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la nervosité ressentie

Tableau 4.7.6.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de la nervosité ressentie par quintile du revenu total du ménage.

| Intensité de la nervosité ressentie | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Forte | 16.1 | 14.9 | 15.7 | 12.0 | 9.8 | 13.4 |
| Modérée | 30.5 | 28.0 | 25.0 | 24.2 | 21.0 | 25.3 |
| Faible | 14.4 | 16.7 | 14.7 | 11.8 | 17.6 | 15.1 |
| Nulle | 39.0 | 40.4 | 44.6 | 52.0 | 51.6 | 46.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1561 | 1550 | 1460 | 1355 | 1154 | 7080 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
21 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la nervosité ressentie

Tableau 4.7.7.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité des maux de tête par milieu de résidence.

| Intensité des maux de tête | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Forte | 18.5 | 28.7 | 27.1 | 25.3 |
| Modérée | 31.7 | 27.4 | 28.1 | 28.8 |
| Faible | 31.8 | 18.1 | 20.4 | 22.8 |
| Nulle | 18.0 | 25.8 | 24.4 | 23.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 989 | 1142 | 4958 | 7089 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité des maux de tête

Tableau 4.7.8.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité des maux de tête par département géographique.

| Intensité des maux de tête | Département géographique | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Forte | 19.4 | 25.6 | 31.5 | 33.8 | 27.1 |
| Modérée | 31.0 | 19.5 | 30.1 | 36.1 | 29.3 |
| Faible | 26.5 | 21.9 | 20.8 | 19.8 | 16.9 |
| Nulle | 23.1 | 33.0 | 17.6 | 10.3 | 26.7 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1920 | 556 | 726 | 373 | 898 |

Tableau 4.7.8. (suite)

| Intensité des maux de tête | Département géographique | | | | Ensemble |
|----------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Forte | 25.7 | 27.0 | 31.7 | 31.9 | 25.3 |
| Modérée | 27.2 | 19.4 | 24.7 | 37.6 | 28.8 |
| Faible | 24.1 | 25.0 | 17.1 | 21.6 | 22.8 |
| Nulle | 23.0 | 28.6 | 26.5 | 8.9 | 23.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 592 | 675 | 689 | 660 | 7089 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité des maux de tête

Tableau 4.7.9.

Distribution des en pourcentage (%) RSI
selon l'intensité des maux de tête par sexe.

| Intensité des maux de tête | Sexe | | Ensemble |
|----------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Forte | 19.2 | 30.9 | 25.3 |
| Modérée | 28.1 | 29.5 | 28.8 |
| Faible | 23.7 | 21.9 | 22.8 |
| Nulle | 29.0 | 17.7 | 23.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3037 | 4052 | 7089 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité des maux de tête

Tableau 4.7.10.

Distribution des RSI en pourcentage (%)
selon l'intensité des maux de tête par tranche d'âge.

| Intensité des maux de tête | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|----------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Forte | 22.5 | 24.2 | 29.9 | 31.6 | 25.3 |
| Modérée | 26.6 | 31.4 | 28.6 | 32.4 | 28.8 |
| Faible | 22.3 | 24.1 | 23.4 | 21.5 | 22.8 |
| Nulle | 28.6 | 20.3 | 18.1 | 14.5 | 23.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2668 | 1987 | 1178 | 1256 | 7089 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité des maux de tête

Tableau 4.7.11.

Distribution des en pourcentage (%) RSI selon l'intensité
des maux de tête par niveau d'étude atteint.

| Intensité des maux de tête | Niveau d'étude atteint | | | Ensemble |
|----------------------------|------------------------|----------|--------------------------|----------|
| | Aucun niveau | Primaire | Secondaire/ Supérieur | |
| Forte | 30.5 | 24.0 | 19.3 | 25.3 |
| Modérée | 28.7 | 28.8 | 29.1 | 28.8 |
| Faible | 21.1 | 22.7 | 25.3 | 22.8 |
| Nulle | 19.6 | 24.5 | 26.3 | 23.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3374 | 2260 | 1455 | 7089 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité des maux de tête

Tableau 4.7.12.

Distribution des en pourcentage (%) RSI selon l'intensité des maux de tête par quintile du revenu total du ménage.

| Intensité des maux de tête | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Forte | 30.5 | 27.0 | 25.5 | 24.1 | 21.1 | 25.3 |
| Modérée | 30.0 | 31.6 | 31.1 | 25.8 | 26.9 | 28.8 |
| Faible | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 23.6 | 26.8 | 22.8 |
| Nulle | 18.8 | 20.6 | 22.9 | 26.5 | 25.2 | 23.1 |
| Total | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1561 | 1550 | 1465 | 1357 | 1156 | 7089 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité des maux de tête

Tableau 4.7.13.

Distribution des en pourcentage (%) RSI selon l'intensité de la déprime par milieu de résidence.

| Intensité de la déprime | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Forte | 9.1 | 13.3 | 17.8 | 15.1 |
| Modérée | 30.5 | 25.0 | 26.4 | 27.2 |
| Faible | 26.5 | 23.7 | 21.6 | 23.1 |
| Nulle | 33.9 | 38.0 | 34.2 | 34.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 974 | 1138 | 4920 | 7032 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

69 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la déprime

Tableau 4.7.14.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de la déprime par département géographique.

| Intensité de la déprime | Département géographique | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Forte | 11.6 | 22.8 | 19.4 | 10.6 | 15.1 |
| Modérée | 29.6 | 15.2 | 24.2 | 39.2 | 31.5 |
| Faible | 20.7 | 17.7 | 25.6 | 27.3 | 22.6 |
| Nulle | 38.1 | 44.3 | 30.8 | 22.9 | 30.8 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1898 | 554 | 725 | 367 | 891 |

Tableau 4.7.14. (suite)

| Intensité de la déprime | Département géographique | | | | Ensemble |
|-------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Forte | 16.0 | 16.7 | 20.1 | 14.8 | 15.1 |
| Modérée | 20.5 | 18.5 | 23.3 | 35.9 | 27.2 |
| Faible | 31.9 | 24.4 | 22.2 | 28.8 | 23.1 |
| Nulle | 31.6 | 40.4 | 34.4 | 20.5 | 34.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 584 | 672 | 686 | 655 | 7032 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

69 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la déprime

Tableau 4.7.15.

Distribution des RSI en pourcentage (%)
selon l'intensité de la déprime par sexe.

| Intensité de la déprime | Sexe | | Ensemble |
|-------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Forte | 11.7 | 18.2 | 15.1 |
| Modérée | 26.8 | 27.6 | 27.2 |
| Faible | 21.8 | 24.2 | 23.1 |
| Nulle | 39.7 | 30.0 | 34.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3014 | 4018 | 7032 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
69 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la déprime

Tableau 4.7.16.

Distribution des RSI en pourcentage (%)
selon l'intensité de la déprime par tranche d'âge.

| Intensité de la déprime | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|-------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Forte | 10.9 | 15.8 | 17.5 | 26.0 | 15.1 |
| Modérée | 24.7 | 29.1 | 30.6 | 28.7 | 27.2 |
| Faible | 19.8 | 26.3 | 26.4 | 25.3 | 23.1 |
| Nulle | 44.6 | 28.8 | 25.5 | 20.0 | 34.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2651 | 1971 | 1165 | 1245 | 7032 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
69 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la déprime

Tableau 4.7.17.

Distribution des RSI en pourcentage (%)
selon l'intensité de la déprime par niveau d'étude atteint.

| Intensité de la déprime | Niveau d'étude atteint | | | Ensemble |
|-------------------------|------------------------|----------|--------------------------|----------|
| | Aucun niveau | Primaire | Secondaire/ Supérieur | |
| Forte | 20.6 | 12.9 | 10.0 | 15.1 |
| Modérée | 27.9 | 27.3 | 26.1 | 27.2 |
| Faible | 24.0 | 22.4 | 22.6 | 23.1 |
| Nulle | 27.5 | 37.4 | 41.4 | 34.7 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3346 | 2242 | 1444 | 7032 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
69 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la déprime

Tableau 4.7.18.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de la déprime par quintile du revenu total du ménage.

| Intensité de la déprime | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Forte | 18.1 | 16.3 | 16.8 | 14.3 | 11.4 | 15.1 |
| Modérée | 32.4 | 29.5 | 27.1 | 26.1 | 22.7 | 27.2 |
| Faible | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 20.1 | 24.8 | 23.1 |
| Nulle | 26.4 | 30.7 | 32.2 | 39.5 | 41.1 | 34.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1555 | 1541 | 1452 | 1342 | 1142 | 7032 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
69 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la déprime

Tableau 4.7.19.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales par milieu de résidence.

| Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Forte | 15.1 | 16.3 | 18.5 | 17.3 |
| Modérée | 20.1 | 19.9 | 22.3 | 21.4 |
| Faible | 22.6 | 18.0 | 17.3 | 18.7 |
| Nulle | 42.2 | 45.8 | 41.9 | 42.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 983 | 1142 | 4948 | 7073 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
28 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales

Tableau 4.7.20.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales par département géographique.

| Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales | Département géographique | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Forte | 15.1 | 30.5 | 23.8 | 26.7 | 14.2 |
| Modérée | 21.7 | 11.7 | 18.6 | 26.5 | 27.2 |
| Faible | 18.9 | 10.7 | 20.2 | 18.6 | 21.7 |
| Nulle | 44.3 | 47.1 | 37.4 | 28.2 | 36.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1910 | 553 | 726 | 373 | 898 |

Tableau 4.7.20. (suite)

| Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales | Département géographique | | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Forte | 15.5 | 15.4 | 18.1 | 14.9 | 17.3 |
| Modérée | 21.5 | 11.3 | 20.3 | 33.2 | 21.4 |
| Faible | 19.7 | 15.0 | 15.0 | 23.3 | 18.7 |
| Nulle | 43.3 | 58.3 | 46.6 | 28.6 | 42.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 592 | 675 | 688 | 658 | 7073 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

28 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales

Tableau 4.7.21.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales par sexe

| Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales | Sexe | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Forte | 11.6 | 22.7 | 17.3 |
| Modérée | 19.1 | 23.6 | 21.4 |
| Faible | 19.1 | 18.3 | 18.7 |
| Nulle | 50.2 | 35.4 | 42.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3031 | 4042 | 7073 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

28 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales

Tableau 4.7.22.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales par tranche d'âge.

| Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Forte | 12.7 | 19.0 | 21.4 | 26.5 | 17.3 |
| Modérée | 19.1 | 22.5 | 24.6 | 24.1 | 21.4 |
| Faible | 16.6 | 20.4 | 21.8 | 19.5 | 18.7 |
| Nulle | 51.6 | 38.1 | 32.2 | 29.9 | 42.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2663 | 1986 | 1175 | 1249 | 7073 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

28 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales

Tableau 4.7.23.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales par niveau d'étude atteint.

| Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales | Niveau d'étude atteint | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Aucun niveau | Primaire | Secondaire/ Supérieur | |
| Forte | 22.6 | 15 | 12.9 | 17.3 |
| Modérée | 23.5 | 20.7 | 19.4 | 21.4 |
| Faible | 20.2 | 17.2 | 18.2 | 18.7 |
| Nulle | 33.7 | 47.1 | 49.4 | 42.6 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Echantillon | 3365 | 2255 | 1453 | 7073 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

28 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales

Tableau 4.7.24.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales par quintile du revenu total du ménage.

| Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Forte | 19.7 | 18.1 | 18.8 | 16.1 | 15.0 | 17.3 |
| Modérée | 28.2 | 22.8 | 20.2 | 20.2 | 17.6 | 21.4 |
| Faible | 18.0 | 20.9 | 18.7 | 18.0 | 18.0 | 18.7 |
| Nulle | 34.1 | 38.2 | 42.3 | 45.7 | 49.4 | 42.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1558 | 1547 | 1463 | 1354 | 1151 | 7073 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

28 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales

Tableau 4.7.25.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment d'inutilité par milieu de résidence.

| Intensité du sentiment d'inutilité | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Forte | 7.3 | 10.7 | 16.8 | 13.6 |
| Modérée | 20.2 | 19.7 | 23.7 | 22.3 |
| Faible | 20.2 | 18.7 | 18.9 | 19.1 |
| Nulle | 52.3 | 50.9 | 40.6 | 45.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 983 | 1141 | 4942 | 7066 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

35 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment d'inutilité

Tableau 4.7.26.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment d'inutilité par département géographique.

| Intensité du sentiment d'inutilité | Département géographique | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Forte | 10.1 | 16.7 | 18.4 | 19.0 | 17.6 |
| Modérée | 22.2 | 12.5 | 19.3 | 23.4 | 28.1 |
| Faible | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 13.5 | 20.7 |
| Nulle | 49.8 | 53.0 | 44.2 | 44.1 | 33.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1910 | 554 | 726 | 372 | 897 |

Tableau 4.7.26. (suite)

| Intensité du sentiment d'inutilité | Département géographique | | | | Ensemble |
|------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Forte | 9.6 | 16.6 | 13.7 | 12.8 | 13.6 |
| Modérée | 23.3 | 15.0 | 23.4 | 30.4 | 22.3 |
| Faible | 21.1 | 22.3 | 20.8 | 21.0 | 19.1 |
| Nulle | 46.0 | 46.1 | 42.1 | 35.8 | 45.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 591 | 671 | 688 | 657 | 7066 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

35 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment d'inutilité

Tableau 4.7.27.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment d'inutilité par sexe.

| Intensité du sentiment d'inutilité | Sexe | | Ensemble |
|------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Forte | 10.5 | 16.5 | 13.6 |
| Modérée | 20.6 | 23.8 | 22.3 |
| Faible | 18.8 | 19.5 | 19.1 |
| Nulle | 50.1 | 40.2 | 45.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3032 | 4034 | 7066 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

35 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment d'inutilité

Tableau 4.7.28.

Distribution des RSI en pourcentage (%)
selon l'intensité du sentiment d'inutilité par tranche d'âge.

| Intensité du sentiment d'inutilité | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Forte | 9.3 | 13.9 | 15.1 | 27.0 | 13.6 |
| Modérée | 19.6 | 22.6 | 27.1 | 26.1 | 22.3 |
| Faible | 16.3 | 21.4 | 23.5 | 20.2 | 19.1 |
| Nulle | 54.8 | 42.1 | 34.3 | 26.7 | 45.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 2660 | 1980 | 1175 | 1251 | 7066 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

35 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment d'inutilité

Tableau 4.7.29.

Distribution des RSI en pourcentage (%)
selon l'intensité du sentiment d'inutilité par niveau d'étude atteint.

| Intensité du sentiment d'inutilité | Niveau d'étude atteint | | | Ensemble |
|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Aucun niveau | Primaire | Secondaire/ Supérieur | |
| Forte | 20.0 | 11.7 | 7.1 | 13.6 |
| Modérée | 25.8 | 21.8 | 18.1 | 22.3 |
| Faible | 20.8 | 19.2 | 16.7 | 19.1 |
| Nulle | 33.5 | 47.4 | 58.2 | 44.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3363 | 2250 | 1453 | 7066 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

35 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment d'inutilité

Tableau 4.7.30.

Distribution des RSI en pourcentage (%)
selon l'intensité du sentiment d'inutilité par quintile du revenu total du ménage.

| Intensité du sentiment d'inutilité | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Forte | 17.4 | 15.1 | 15.6 | 12.4 | 9.3 | 13.6 |
| Modérée | 28.3 | 25.6 | 22.1 | 21.9 | 16.0 | 22.3 |
| Faible | 20.3 | 20.7 | 20.1 | 18.2 | 17.2 | 19.1 |
| Nulle | 34.0 | 38.6 | 42.2 | 47.5 | 57.5 | 45.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1554 | 1546 | 1461 | 1353 | 1152 | 7066 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

35 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment d'inutilité

Tableau 4.7.31.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété par milieu de résidence.

| Intensité du sentiment de peur ou d'anxiété | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Forte | 14.6 | 10.9 | 13.9 | 13.6 |
| Modérée | 25.4 | 19.5 | 21.6 | 22.2 |
| Faible | 29.7 | 18.8 | 20.0 | 22.2 |
| Nulle | 30.3 | 50.8 | 44.5 | 42.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 986 | 1142 | 4950 | 7078 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

23 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété

Tableau 4.7.32.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété par département géographique.

| Intensité du sentiment de peur ou d'anxiété | Département géographique | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Forte | 13.8 | 14.2 | 20.9 | 13.6 | 11.9 |
| Modérée | 24.2 | 9.5 | 18.7 | 22.5 | 27.8 |
| Faible | 24.4 | 18.0 | 22.1 | 26.9 | 23.4 |
| Nulle | 37.6 | 58.3 | 38.3 | 37.0 | 36.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1912 | 555 | 726 | 373 | 898 |

Tableau 4.7.32. (suite)

| Intensité du sentiment de peur ou d'anxiété | Département géographique | | | | Ensemble |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Forte | 9.6 | 12.9 | 13.6 | 8.6 | 13.6 |
| Modérée | 28.8 | 8.8 | 18.8 | 30.2 | 22.2 |
| Faible | 18.7 | 22.9 | 14.2 | 19.2 | 22.2 |
| Nulle | 42.9 | 55.4 | 53.4 | 42.0 | 42.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 591 | 674 | 689 | 660 | 7078 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

23 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété

Tableau 4.7.33.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété par sexe.

| Intensité du sentiment de peur ou d'anxiété | Sexe | | Ensemble |
|---------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Forte | 10.5 | 16.6 | 13.6 |
| Modérée | 19.8 | 24.4 | 22.2 |
| Faible | 22.1 | 22.2 | 22.2 |
| Nulle | 47.6 | 36.8 | 42.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3036 | 4042 | 7078 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
23 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété

Tableau 4.7.34.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété par niveau d'étude atteint.

| Intensité du sentiment de peur ou d'anxiété | Niveau d'étude atteint | | | Ensemble |
|---------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Aucun niveau | Primaire | Secondaire/ Supérieur | |
| Forte | 17.2 | 12.5 | 10.0 | 13.6 |
| Modérée | 24.1 | 20.9 | 21.2 | 22.2 |
| Faible | 21.5 | 22.0 | 23.2 | 22.2 |
| Nulle | 37.2 | 44.5 | 45.7 | 42.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 3366 | 2258 | 1454 | 7078 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
23 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété

Tableau 4.7.35.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété par quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc.

| Intensité du sentiment de peur ou d'anxiété | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Forte | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 13.8 | 11.5 | 13.6 |
| Modérée | 26.7 | 22.4 | 21.2 | 20.6 | 21.1 | 22.2 |
| Faible | 21.5 | 23.7 | 21.9 | 18.8 | 24.6 | 22.2 |
| Nulle | 37.0 | 39.2 | 42.7 | 46.8 | 42.8 | 42.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1558 | 1548 | 1463 | 1355 | 1154 | 7078 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)
23 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété

4.8. Connaissance du Sida et prévalence du Sida

Tableau 4.8.1.

Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA par milieu de résidence.

| Information sur le VIH / Sida | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA | 96.0 | 95.3 | 90.4 | 92.4 |
| Echantillon | 990 | 1145 | 4966 | 7101 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.2.

Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA par département géographique

| Information sur le VIH / Sida | Département géographique | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA | 91.5 | 93.8 | 95.0 | 75.4 | 91.8 |
| Echantillon | 1922 | 560 | 727 | 373 | 899 |

Tableau 4.8.2. (suite)

| Information sur le VIH / Sida | Département géographique | | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA | 96.1 | 94.5 | 90.9 | 97.5 | 92.4 |
| Echantillon | 593 | 676 | 690 | 661 | 7101 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.3.

Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA par sexe.

| Information sur le VIH / Sida | Sexe | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA | 93.4 | 91.5 | 92.4 |
| Echantillon | 3043 | 4058 | 7101 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.4.

Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA par tranche d'âge.

| Information sur le VIH / Sida | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA | 95.0 | 95.0 | 91.6 | 79.7 | 92.4 |
| Echantillon | 2672 | 1989 | 1181 | 1259 | 7101 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.5.

Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA par niveau d'étude.

| Information sur le VIH / Sida | Niveau d'étude atteint | | | | Ensemble |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|--------------------|----------|
| | Aucun niveau | Primaire | Secondaire | Etudes supérieures | |
| Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA | 86.5 | 95.3 | 97.5 | 94.0 | 92.4 |
| Echantillon | 3385 | 2301 | 1353 | 62 | 7101 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.6.

Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA par quintile du revenu total du ménage.

| Information sur le VIH / Sida | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA | 86.7 | 90.9 | 92.7 | 94.8 | 95.0 | 92.4 |
| Echantillon | 1548 | 1512 | 1468 | 1362 | 1211 | 7101 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.7.

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA par milieu de résidence.

| Recours à une protection contre le VIH / Sida | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Proportion de RSI ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA | 89.9 | 79.9 | 69.3 | 76.0 |
| Echantillon | 952 | 1089 | 4458 | 6499 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.8.

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA par département géographique.

| Recours à une protection contre le VIH / Sida | Département géographique | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Proportion de RSI ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA | 80.1 | 65.5 | 65.4 | 78.2 | 70.3 |
| Echantillon | 1719 | 519 | 692 | 266 | 827 |

Tableau 4.8.8. (suite)

| Recours à une protection contre le VIH / Sida | Département géographique | | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Proportion de RSI ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA | 85.0 | 85.5 | 78.2 | 65.6 | 76.0 |
| Echantillon | 574 | 636 | 623 | 643 | 6499 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.9.

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA par sexe.

| Recours à une protection contre le VIH / Sida | Sexe | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Proportion de RSI ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA | 78.6 | 73.5 | 76.0 |
| Echantillon | 2835 | 3664 | 6499 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.10.

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA par tranche d'âge.

| Recours à une protection contre le VIH / Sida | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Proportion de RSI ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA | 79.8 | 79.2 | 71.2 | 58.9 | 76.0 |
| Echantillon | 2533 | 1879 | 1082 | 1005 | 6499 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.11.

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA par quintile du revenu du ménage.

| Recours à une protection contre le VIH / Sida | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Proportion de RSI ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA | 67.9 | 72.2 | 75.4 | 76.6 | 83.4 | 76.0 |
| Echantillon | 1301 | 1384 | 1356 | 1294 | 1164 | 6499 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.12.

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant fait le test de dépistage du VIH par milieu de résidence.

| | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH | 10.2 | 6.7 | 2.3 | 4.9 |
| Echantillon | 952 | 1089 | 4458 | 6499 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.13.

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant fait le test de dépistage du VIH par département géographique.

| | Département géographique | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|----------|------------|
| | Ouest | Sud-Est | Nord | Nord-Est | Artibonite |
| Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH | 7.7 | 2.4 | 6.0 | 1.3 | 2.3 |
| Echantillon | 1719 | 519 | 692 | 266 | 827 |

Tableau 4.8.13. (suite)

| | Département géographique | | | | Ensemble |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------------|------------|----------|
| | Centre | Sud | Grande-Anse | Nord-Ouest | |
| Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 4.9 | 4.9 |
| Echantillon | 574 | 636 | 623 | 643 | 4023 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.14.

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA
et ayant fait le test de dépistage du VIH par sexe.

| | Sexe | | Ensemble |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH | 4.5 | 5.3 | 4.9 |
| Echantillon | 2835 | 3664 | 6499 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.15.

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA
et ayant fait le test de dépistage du VIH par tranche d'âge.

| | Tranche d'âge | | | | Ensemble |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| | 15- 29 ans | 30- 44 ans | 45- 59 ans | 60 ans et plus | |
| Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH | 4.6 | 7.2 | 4.1 | 2.3 | 4.9 |
| Echantillon | 2533 | 1879 | 1082 | 1005 | 6499 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.16.

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA
et ayant fait le test de dépistage du VIH par niveau d'étude atteint.

| | Niveau d'étude atteint | | | | Ensemble |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|--------------------|----------|
| | Aucun niveau | Primaire | Secondaire | Etudes supérieures | |
| Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH | 1.6 | 3.9 | 9.4 | 36.1 | 4.9 |
| Echantillon | 2926 | 2193 | 1320 | 60 | 6499 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.17.

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant fait le test de dépistage
du VIH par quintile du revenu total du ménage.

| | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH | 2.1 | 2.2 | 3.9 | 3.4 | 10.6 | 4.9 |
| Echantillon | 1301 | 1384 | 1356 | 1294 | 1164 | 6499 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

4.9. Santé de la reproduction.

4.9.1. Soins pré-natals

Tableau 4.9.1.1.

Distribution des naissances vivantes des 5 années précédant l'enquête en pourcentage (%) selon le personnel de santé consulté par la mère au cours de la grossesse par milieu de résidence.

| Personnel de santé consulté | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Médecin | 67.2 | 48.0 | 42.6 | 50.3 |
| Infirmière | 27.2 | 41.5 | 39.2 | 36.3 |
| Sage-femme, matrone ou autre | 0.6 | 2.3 | 7.3 | 4.6 |
| Non | 5.0 | 8.2 | 10.9 | 8.8 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 510 | 682 | 1920 | 3112 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

493 des mères concernées n'ont pas répondu quant au personnel de santé consulté

Tableau 4.9.1.2.

Distribution des naissances vivantes des 5 années précédant l'enquête en pourcentage (%) selon le personnel de santé consulté par la mère au cours de la grossesse par quintile du revenu total du ménage du ménage.

| Personnel de santé consulté | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Médecin | 42.6 | 46.0 | 45.5 | 52.2 | 60.2 | 50.3 |
| Infirmière | 37.6 | 38.1 | 39.9 | 35.5 | 32.0 | 36.3 |
| Sage-femme, matrone ou autre | 5.9 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 1.8 | 4.6 |
| Non | 13.9 | 10.9 | 8.6 | 6.8 | 6.0 | 8.8 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 594 | 621 | 630 | 649 | 618 | 3112 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

493 des mères concernées n'ont pas répondu quant au personnel de santé consulté

Tableau 4.9.1.3.

Proportion de femmes ayant reçu des soins pré-natals (au cours des 5 dernières années précédant l'enquête) selon le type de service de santé consulté par milieu de résidence.

| Type de service de santé | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|--------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Centre de santé | 50.0 | 34.0 | 28.3 | 34.0 |
| Clinique communautaire | 3.4 | 24.3 | 28.1 | 22.0 |
| Hôpital public | 22.1 | 29.4 | 30.5 | 28.5 |
| Hôpital privé | 24.3 | 16.7 | 10.3 | 14.3 |
| Clinique privée | 4.4 | 2.7 | 1.7 | 2.4 |
| Clinique spécialisée | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| A la maison | 1.1 | 4.1 | 10.6 | 7.6 |
| Autres | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.1 |
| Echantillon | 355 | 529 | 1503 | 2387 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH).

Question à réponses multiples. Le total peut excéder 100.

Tableau 4.9.1.4.

Proportion de femmes ayant reçu des soins pré-natals (au cours des 5 dernières années précédant l'enquête) selon le type de service de santé consulté par quintile du revenu total du ménage.

| Type de service de santé | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Centre de santé | 27.9 | 35.0 | 36.5 | 33.2 | 36.0 | 34.0 |
| Clinique communautaire | 25.5 | 28.9 | 26.7 | 21.5 | 10.6 | 22.0 |
| Hôpital public | 32.6 | 27.5 | 29.1 | 28.1 | 26.0 | 28.5 |
| Hôpital privé | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 13.5 | 27.1 | 14.3 |
| Clinique privée | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 5.8 | 2.4 |
| Clinique spécialisée | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
| A la maison | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 3.4 | 7.6 |
| Autres | 3.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| Echantillon | 449 | 483 | 489 | 497 | 469 | 2387 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH).
Question à réponses multiples. Le total peut excéder 100.

Tableau 4.9.1.5.

Distribution des naissances vivantes selon les raisons de l'absence de soins pré-natals au cours de la grossesse par milieu de résidence.

| Raison de l'absence de soins pré-natals | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Trop cher | 49.4 | 41.1 | 40.0 | 41.3 |
| Pas besoin | 37.7 | 35.2 | 22.0 | 25.3 |
| Trop loin | - | - | 12.6 | 9.8 |
| Autres | 12.9 | 23.8 | 25.3 | 23.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 32 | 82 | 298 | 412 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.9.1.6.

Distribution des naissances vivantes selon les raisons de l'absence de soins pré-natals au cours de la grossesse par quintile du revenu total du ménage du ménage.

| Raison de l'absence de soins pré-natals | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Trop cher | 53.5 | 35.2 | 38.8 | 36.9 | 38.0 | 41.3 |
| Pas besoin | 16.8 | 22.0 | 31.1 | 30.8 | 31.8 | 25.3 |
| Trop loin | 10.9 | 12.7 | 13.0 | 3.2 | 6.0 | 9.8 |
| Autres | 18.8 | 30.1 | 17.1 | 29.1 | 24.1 | 23.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 111 | 101 | 83 | 73 | 44 | 412 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

4.9.2. Soins post-natals

Tableau 4.9.2.1.

Distribution des femmes de 14 ans et plus en pourcentage (%) selon le résultat de la dernière grossesse par milieu de résidence.

| Résultat de la dernière grossesse | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Accouchement - enfant en vie | 98.0 | 97.3 | 98.4 | 98.1 |
| Enfant mort - né | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| Fausse couche / avortement | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 345 | 532 | 1566 | 2443 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.9.2.2.

Distribution des femmes de 14 ans et plus en pourcentage (%) selon le résultat de la dernière grossesse par quintile du revenu total du ménage.

| Résultat de la dernière grossesse | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Accouchement - enfant en vie | 97.6 | 98.5 | 99.0 | 97.6 | 98.1 | 98.1 |
| Enfant mort - né | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.0 |
| Fausse couche / avortement | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 498 | 503 | 492 | 490 | 460 | 2443 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.9.2.3.

Distribution des femmes de 14 ans et plus en pourcentage (%) selon le résultat de la dernière grossesse par type de personnel de santé consulté pour les soins pré-natals.

| Résultat de la dernière grossesse | Personnel de santé consulté | | | | Ensemble |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|-------|----------|
| | Médecin | Infirmière | Sage-femme, matrone, autre | Aucun | |
| Accouchement - enfant en vie | 97.9 | 98.7 | 98.7 | 97.3 | 98.1 |
| Enfant mort - né | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| Fausse couche / avortement | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 1349 | 667 | 136 | 289 | 2441 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.9.2.4.

Distribution des naissances vivantes des 5 années précédant l'enquête en pourcentage (%) selon le personnel de santé consulté par la mère au cours de la grossesse pour les soins post-natals (40 jours après l'accouchement) par milieu de résidence.

| Personnel de santé consulté 40 jours après l'accouchement | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Médecin | 53.1 | 39.9 | 27.6 | 34.7 |
| Infirmière | 4.4 | 18.5 | 15.2 | 13.2 |
| Sage-femme, matrone, autre | 1.0 | 2.0 | 5.6 | 4.1 |
| Aucun | 41.5 | 39.6 | 51.6 | 48.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 341 | 513 | 1541 | 2395 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.9.2.5.

Distribution des naissances vivantes des 5 années précédant l'enquête en pourcentage (%) selon le personnel de santé consulté par la mère au cours de la grossesse pour les soins post-natals (40 jours après l'accouchement) par quintile du revenu total du ménage du ménage.

| Personnel de santé consulté 40 jours après l'accouchement | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Médecin | 25.3 | 27.2 | 32.1 | 37.6 | 47.9 | 34.7 |
| Infirmière | 16.0 | 14.3 | 15.4 | 13.5 | 7.9 | 13.2 |
| Sage-femme, matrone, autre | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 5.5 | 2.2 | 4.1 |
| Aucun | 54.1 | 54.1 | 48.4 | 43.3 | 42.0 | 48.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 487 | 492 | 488 | 479 | 449 | 2395 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.9.2.6.

Distribution des naissances vivantes des 5 années précédant l'enquête selon les raisons de l'absence de soins post-natals par milieu de résidence.

| Raison de l'absence de soins post-natals | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Trop cher | 30.3 | 34.0 | 39.7 | 37.3 |
| Opposition du mari | 58.6 | 56.2 | 47.9 | 50.8 |
| Manque de confiance | 11.1 | 9.8 | 12.5 | 11.9 |
| Total | 100 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 131 | 228 | 811 | 1170 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.9.2.7.

Distribution des naissances vivantes des 5 années précédant l'enquête selon les raisons de l'absence de soins post-natals par quintile du revenu total du ménage. En pourcentage (%) des naissances vivantes sans soins post-natals.

| Raison de l'absence de soins post-natals | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Trop cher | 48.6 | 41.4 | 44.0 | 27.8 | 23.4 | 37.3 |
| Opposition du mari | 39.1 | 43.4 | 45.6 | 62.6 | 64.6 | 50.8 |
| Manque de confiance | 12.2 | 15.2 | 10.4 | 9.6 | 12.0 | 11.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 264 | 274 | 242 | 210 | 180 | 1170 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

4.10. Couverture assurantielle

Tableau 4.10.1.

Taux de couverture en pourcentage (%) en assurance-santé de la population par milieu de résidence.

| | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Taux de couverture en assurance-santé | 7.0 | 2.8 | 1.7 | 3.1 |
| Echantillon | 4476 | 5432 | 23099 | 33007 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.10.2.

Taux de couverture en pourcentage (%) en assurance-santé de la population par sexe.

| | Sexe | | Ensemble |
|---------------------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Taux de couverture en assurance-santé | 3.1 | 3.0 | 3.1 |
| Echantillon | 15959 | 17048 | 33007 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.10.3.

Taux de couverture en pourcentage (%) en assurance-santé de la population par situation d'activité.

| | Situation d'activité | | | | Ensemble |
|---------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------------------------|----------|
| | Actif occupé | Chômeur | Inactif | Hors population en âge de travailler | |
| Taux de couverture en assurance-santé | 4.5 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 3.1 |
| Echantillon | 9201 | 2903 | 12425 | 8478 | 33007 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.10.4.

Taux de couverture en pourcentage (%) en assurance-santé de la population par quintile du revenu total du ménage.

| | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Taux de couverture en assurance-santé | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 6.2 | 3.1 |
| Echantillon | 6397 | 6747 | 6742 | 6864 | 6257 | 33007 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.10.5.

Distribution de la population disposant d'une assurance-santé en pourcentage (%) selon le type d'assurance par milieu de résidence.

| Type d'assurance | Milieu de résidence | | | Ensemble |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|----------|
| | Aire Métropolitaine | Autre urbain | Rural | |
| Assurance privée | 49.5 | 25.1 | 10.6 | 32.5 |
| Assurance liée à l'emploi | 38.3 | 56.1 | 79.1 | 55.2 |
| Les deux types d'assurance | 12.3 | 18.8 | 10.4 | 12.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 301 | 144 | 366 | 811 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.10.6.

Distribution de la population disposant d'une assurance-santé en pourcentage (%) selon le type d'assurance par sexe.

| Type d'assurance | Sexe | | Ensemble |
|----------------------------|-------|-------|----------|
| | Homme | Femme | |
| Assurance privée | 33.9 | 31.1 | 32.5 |
| Assurance liée à l'emploi | 53.7 | 56.7 | 55.2 |
| Les deux types d'assurance | 12.4 | 12.3 | 12.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 409 | 402 | 811 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.10.7.

Distribution de la population disposant d'une assurance-santé en pourcentage (%)
selon le type d'assurance par situation d'activité.

| Type d'assurance | Situation d'activité | | | | Ensemble |
|----------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------------------------|----------|
| | Actif occupé | Chômeur | Inactif | Hors population en âge de travailler | |
| Assurance privée | 37.6 | 24.5 | 26.4 | 36.5 | 32.5 |
| Assurance liée à l'emploi | 48.3 | 64.1 | 65.5 | 47.1 | 55.2 |
| Les deux types d'assurance | 14.1 | 11.4 | 8.2 | 16.3 | 12.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 324 | 87 | 255 | 145 | 811 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.10.8.

Distribution de la population disposant d'une assurance-santé en pourcentage (%)
selon le type d'assurance par quintile de revenu du ménage.

| Type d'assurance | Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc | | | | | Ensemble |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|
| | Q1 (20% les plus faibles) | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 (20% les plus élevés) | |
| Assurance privée | 3.7 | 22.1 | 10.3 | 25.6 | 50.5 | 32.5 |
| Assurance liée à l'emploi | 90.9 | 65.6 | 78.8 | 55.2 | 37.9 | 55.2 |
| Les deux types d'assurance | 5.4 | 12.2 | 10.9 | 19.3 | 11.6 | 12.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Echantillon | 95 | 129 | 104 | 143 | 340 | 811 |

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

